

[Валидол в капсулах](#)



Код АТХ:

- [C01EX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Левоментола раствор в ментил изовалерате](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и освобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, гистамина, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формировании болевых ощущений. При сублингвальном приеме терапевтический эффект в среднем наступает через 5 мин, при этом до 70% препарата высвобождается в течение 3 мин.

Показания к применению:

- кардиалгия;
- стенокардия;
- синдром "укачивания" (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни);
- истерия;
- невроз;
- головная боль на фоне приема нитратов.

Относится к болезням:

- [Воздушная болезнь](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Рвота](#)
- [Стенокардия](#)
- [Тошнота](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Таблетки - сублингвально, по 1 таб. 2-3 раза/сут. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 мин после приема необходимо назначение другой терапии.

Побочное действие:

Тошнота, слезотечение, головокружение.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует назначать с осторожностью больным сахарным диабетом (для лекарственных форм, содержащих сахар).

Источник: http://drugs.thead.ru/Validol_V_Kapsulah