Валидола Таблетки 0.06 Г

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и освобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, гистамина, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формировании болевых ощущений. При сублингвальном приеме терапевтический эффект в среднем наступает через 5 мин, при этом до 70% препарата высвобождается в течение 3 мин.

Показания к применению:

— кардиалгия;

— стенокардия;

— синдром "укачивания" (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни);

— истерия;

— невроз;

— головная боль на фоне приема нитратов.

Относится к болезням:

- Воздушная болезнь
- Кардиалгия
- Кардит
- Неврит
- Неврозы
- Рвота
- Стенокардия
- Тошнота

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Таблетки - сублингвально, по 1 таб. 2-3 раза/сут. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 мин после приема необходимо назначение другой терапии.

Побочное действие:

Тошнота, слезотечение, головокружение.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует назначать с осторожностью больным сахарным диабетом (для лекарственных форм, содержащих сахар).

Источник: http://drugs.thead.ru/Validola_Tabletki_006_G