

## Валокордин-Доксиламин



### **Код АТХ:**

- [R06AA09](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Доксиламин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Интермедианты](#)
- [Нейротропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов из группы этаноламинов. Оказывает седативное, снотворное действие. Сокращает время засыпания, повышает длительность и качество сна, не изменяет фазы сна. Оказывает противоаллергическое действие. Обладает м-холиноблокирующей активностью.

Выраженность седативного действия сопоставима с барбитуратами. Длительность действия - 6-8 ч.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь C<sub>max</sub> в плазме крови достигается через 2-3 ч. T<sub>1/2</sub> - около 10 ч.

### **Показания к применению:**

Расстройства сна, бессонница. Аллергические реакции, кожный зуд. В качестве компонента комбинированных препаратов, применяющихся при простудных заболеваниях, кашле.

### **Относится к болезням:**

- [Бессонница](#)
- [Зуд](#)

## **Противопоказания:**

Закротоугольная глаукома, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, задержка мочи, период лактации, детский возраст до 6 лет (в качестве антигистаминного средства), детский и подростковый возраст до 15 лет (в качестве седативно-снотворного средства), повышенная чувствительность к доксиламину.

## **Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь. Взрослым при бессоннице, нарушениях сна - 15-25 мг за 15-30 мин до сна. При аллергических реакциях - в дозах до 25 мг каждые 4-6 ч.

Детям в возрасте 6-12 лет - по 6.25-12.5 мг при необходимости - каждые 4-6 ч.

*Максимальная суточная доза для взрослых - 150 мг.*

## **Побочное действие:**

*Возможно:* вялость, сонливость, сухость во рту, нарушения аккомодации, запор, нарушения мочеиспускания.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении с антидепрессантами, барбитуратами, бензодиазепинами, клонидином, опиоидными анальгетиками, нейролептиками, транквилизаторами усиливается угнетающее действие доксиламина на ЦНС.

При одновременном применении с атропином и атропиноподобными средствами, имипрамином, противопаркинсоническими средствами с антихолинергическим действием, дизопирамидом, производными фенотиазина повышается риск развития антихолинергических побочных эффектов (сухость во рту, запор, задержка мочеиспускания).

При одновременном применении с этанолом усиливается седативное действие доксиламина.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применяют при заболеваниях легких.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При лечении доксиламином (главным образом при применении в дневное время - при аллергических реакциях, зуде, в составе комбинированных препаратов для лечения простуды) необходимо избегать вождения транспортных средств, а также других видов деятельности, требующих быстрых психомоторных реакций.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 6 лет (в качестве антигистаминного средства), в возрасте до 15 лет (в качестве седативно-снотворного средства).

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Valokordin-Doksilamin>