Валокормид

Код АТХ:

- N05CM

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Рацементол
- Белладонны настойка
- Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка
- Ландыша травы настойка
- Натрия бромид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, в состав которого входят: белладонны настойка, валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка, ландыша травы настойка, натрия бромид, рацементол.

Валокормид выпускается в форме капель для приема внутрь. Оказывает седативное, кардиотоническое и спазмолитическое действие.

Препараты, содержащие валериану и натрия бромид, уменьшают возбудимость ЦНС.

Настойка ландыша, содержащая сердечные гликозиды, оказывает кардиотоническое действие.

Алкалоиды красавки обладают м-холиноблокирующим действием.

Показания к применению:

— функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы (в качестве седативного средства).

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— выраженный кардиосклероз;

— эндокардит;

— миокардит;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— дыхательная недостаточность;

— закрытоугольная глаукома.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 10-20 капель 2-3 раза/сут, до еды.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, диарея, аритмии, миастения, головная боль, парез аккомодации, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: "бромизм" - ринит, кашель, конъюнктивит, вялость, снижение памяти, кожная сыпь (acne bromica).

Лечение: натрия хлорид 10-20 г/сут в сочетании с большим количеством воды (3-5 л/сут).

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

При нарушениях функции почек

Противопоказание — почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказание — печеночная недостаточность.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Valokormid