

## Валокормид



### Код АТХ:

- [N05CM](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Рацементол](#)
- [Белладонны настойка](#)
- [Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка](#)
- [Ландыша травы настойка](#)
- [Натрия бромид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения, в состав которого входят: белладонны настойка, валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка, ландыша травы настойка, натрия бромид, рацементол.

Валокормид выпускается в форме капель для приема внутрь. Оказывает седативное, кардиотоническое и спазмолитическое действие.

Препараты, содержащие валериану и натрия бромид, уменьшают возбудимость ЦНС.

Настойка ландыша, содержащая сердечные гликозиды, оказывает кардиотоническое действие.

Алкалоиды красавки обладают м-холиноблокирующим действием.

## **Показания к применению:**

— функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы (в качестве седативного средства).

## **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- выраженный кардиосклероз;
- эндокардит;
- миокардит;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- дыхательная недостаточность;
- закрытоугольная глаукома.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь, по 10-20 капель 2-3 раза/сут, до еды.

## **Побочное действие:**

Тошнота, рвота, диарея, аритмии, миастения, головная боль, парез аккомодации, аллергические реакции.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* "бромизм" - ринит, кашель, конъюнктивит, вялость, снижение памяти, кожная сыпь (аспе bromica).

*Лечение:* натрия хлорид 10-20 г/сут в сочетании с большим количеством воды (3-5 л/сут).

## **Особые указания и меры предосторожности:**

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказание — почечная недостаточность.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказание — печеночная недостаточность.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Valokormid>