Валосердин



Код АТХ:

- N05CM

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фенобарбитал
- Этилбромизовалерианат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты является седативным, легким снотворным и спазмолитическим средством.

Фенобарбитал оказывает вазодилатирующее и седативное действие, снотворное (в соответствующих дозах).

Мятное масло обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

Показания к применению:

— вазомоторные расстройства;

— невроз (в составе комбинированной терапии);

— раздражительность;

— тревожность;

— коронароспазм (нерезко выраженный);

— тахикардия;

— бессонница;

— артериальная гипертензия (ранние стадии);

— кардиалгия;

— кишечная и желчная колика.

Относится к болезням:

- Бессонница
- Гипертензия
- Желчная колика
- Кардиалгия
- Кардит
- Неврит
- Неврозы
- Тахикардия

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь (до еды), по 15-30 кап 2-3 раза/сут. При *тахикардии* и *спазмах сосудов* разовая доза может быть увеличена до 40-45 кап.

Побочное действие:

Сонливость, головокружение; при уменьшении дозы эти явления проходят.

При длительном приеме больших доз - развитие хронического отравления бромом: депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений, лекарственная зависимость.

Передозировка:

Симптомы: при легкой и среднетяжелой интоксикации - сонливость, головокружение, психомоторные нарушения; в тяжелых случаях - снижение АД, нарушение дыхания, тахикардия, коллапс, снижение периферических рефлексов, кома.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с седативными средствами - усиление эффекта.

Может повышать токсичность метотрексата.

Одновременное применение с нейролептиками и анксиолитиками усиливает, а со стимуляторами ЦНС - ослабляет действие каждого из компонентов препарата.

Этанол усиливает эффекты препарата и может повышать его токсичность.

Фенобарбитал снижает антибактериальную активность антибиотиков и сульфаниламидов, противогрибковое действие гризеофульвина (снижает всасывание), эффективность непрямых антикоагулянтов, ГКС, доксициклина, эстрогенов и других лекарственных средств, метаболизирующихся в печени по пути окисления (ускоряет их разрушение).

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Valoserdin