

Валосердин



Код АТХ:

- [N05CM](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенобарбитал](#)
- [Этилбромизовалерианат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Этиловый эфир α -бромизовалериановой кислоты является седативным, легким снотворным и спазмолитическим средством.

Фенобарбитал оказывает вазодилатирующее и седативное действие, снотворное (в соответствующих дозах).

Мятное масло обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

Показания к применению:

Валосердин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- вазомоторные расстройства;
- невроз (в составе комбинированной терапии);
- раздражительность;
- тревожность;
- коронароспазм (нерезко выраженный);
- тахикардия;
- бессонница;
- артериальная гипертензия (ранние стадии);
- кардиалгия;
- кишечная и желчная колика.

Относится к болезням:

- [Бессонница](#)
- [Гипертензия](#)
- [Желчная колика](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Тахикардия](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь (до еды), по 15-30 кап 2-3 раза/сут. При *тахикардии* и *спазмах сосудов* разовая доза может быть увеличена до 40-45 кап.

Побочное действие:

Сонливость, головокружение; при уменьшении дозы эти явления проходят.

При длительном приеме больших доз - развитие хронического отравления бромом: депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений, лекарственная зависимость.

Передозировка:

Симптомы: при легкой и среднетяжелой интоксикации - сонливость, головокружение, психомоторные нарушения; в тяжелых случаях - снижение АД, нарушение дыхания, тахикардия, коллапс, снижение периферических рефлексов, кома.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с седативными средствами - усиление эффекта.

Может повышать токсичность метотрексата.

Одновременное применение с нейролептиками и анксиолитиками усиливает, а со стимуляторами ЦНС - ослабляет действие каждого из компонентов препарата.

Этанол усиливает эффекты препарата и может повышать его токсичность.

Фенобарбитал снижает антибактериальную активность антибиотиков и сульфаниламидов, противогрибковое действие гризеофульвина (снижает всасывание), эффективность непрямых антикоагулянтов, ГКС, доксицилина, эстрогенов и других лекарственных средств, метаболизирующихся в печени по пути окисления (ускоряет их разрушение).

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Valoserdin>