

[Ваньтун Артиплас](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Пластырь 7×10 см.

	100 см²
густой экстракт корней аконита Кармишеля	36.2 мг
густой экстракт корней аконита Кузнецова	36.2 мг
борнеол	50 мг
густой экстракт почек гвоздичного дерева	14.5 мг
дифенгидрамина гидрохлорид	18 мг
густой экстракт корней дудника даурского	22.5 мг
густой экстракт коры коричника китайского	14.4 мг
густой экстракт корневищ и корней любистока сычуаньского	36.2 мг
метилсалицилат	20 мг
ментол рацемический	50 мг
густой экстракт цветков сафлоры красильной	14.4 мг
густой экстракт корней соломоцвета двузубого	14.4 мг
густой экстракт корневищ хохлатки	36.2 мг

2 шт. - пакеты из комбинированного материала (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает местное противовоспалительное и выраженное анальгезирующее действие, обусловленные местными рефлекторными реакциями (в т.ч. улучшение микроциркуляции крови в очаге поражения). Анальгезирующий эффект развивается к 4 дню лечения и усиливается в последующие дни применения препарата.

Показания к применению:

— в качестве местного обезболивающего средства в комплексном лечении остеоартроза.

Относится к болезням:

- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)

Противопоказания:

— открытые раны, нарушение целостности кожного покрова или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема);

— беременность;

— период кормления грудью;

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Удаляют защитную бумагу и накладывают пластырь на чистую и неповрежденную кожу на 12-24 часа. Курс лечения составляет 14 дней. В зависимости от выраженности клинических проявлений, по рекомендации врача, возможны повторные курсы лечения.

Побочное действие:

В редких случаях возможно покраснение кожи или зуд в месте аппликации пластыря. Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нестероидные противовоспалительные препараты оказывают синергидное действие.

Особые указания и меры предосторожности:

При покраснении кожи или появлении зуда в месте наложения пластыря рекомендуется нанесение небольшого количества нейтрального крема (вазелина) перед очередной аппликацией.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vantun_Artiplas