Вартек



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Подофиллотоксин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Противоопухолевые средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство с прижигающим и мумифицирующим действием. Представляет собой компонент подофиллина, получаемого из экстракта корней растения подофилла. Оказывает цитостатическое действие, уменьшает выраженность воспалительных реакций. При местном применении вызывает некроз остроконечных кондилом.

Показания к применению:

Остроконечные кондиломы.

Относится к болезням:

- Кондиломы

Противопоказания:

Детский возраст, одновременное лечение препаратами, содержащими подофиллин, беременность, лактация, повышенная чувствительность к подофиллину.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно (в соответствии с инструкцией) 2 раза/сут с интервалом 12 ч в течение 3 дней ежедневно. Лечение следует продолжать до исчезновения кондиломы, но не более 5 недель.

Побочное действие:

Возможно: покраснение, болезненность, изъязвления эпителиального покрова кондиломы (обычно в начале лечения, чаще на 2-3 день применения).

При наличии больших кондилом в препуциальной области возможно развитие отека и баланопостита.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Не предназначен для лечения других бородавок или родимых пятен.

В случае контакта раствора со слизистой глаз немедленно промыть их водой.

Во время лечения пациентам следует избегать чрезмерного употребления алкоголя.

Мужчины до полного выздоровления должны пользоваться презервативами. Требуется обследование и, при необходимости, лечение сексуальных партнеров.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vartek