

## Вазобрал (таблетки)



### Код АТХ:

- [C04AE51](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Дигидроэргокриптин](#)
- [Кофеин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** практически белого цвета, круглые, плоские, со скошенным краем, с риской на одной стороне и штампом "VASOBRAL" - на другой.

|                                   | <b>1 таб.</b> |
|-----------------------------------|---------------|
| альфа-дигидроэргокриптина мезилат | 4 мг          |
| кофеин                            | 40 мг         |

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат.  $\alpha$ -дигидроэргокриптин - дигидрированное производное спорыньи, блокирует  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  адренорецепторы. Оказывает допаминергическое, серотонинергическое действие, уменьшает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, снижает проницаемость сосудистой стенки, увеличивает количество функционирующих капилляров, улучшает кровообращение и процессы метаболизма в головном мозге, повышает устойчивость тканей мозга к гипоксии.

Кофеин обладает психостимулирующим и аналептическим действием, усиливает процессы возбуждения в коре головного мозга - повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает усталость и сонливость, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры,

## Вазобрал (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

оказывает диуретическое действие.

### Фармакокинетика

При пероральном приеме, всасывание дигидроэргокриптина ускоряется в присутствии кофеина ( $T_{\max}$  - 0,5 часа).

Максимальная концентрация после приема внутрь 8 мг  $\alpha$ -дигидроэргокриптина составляет 227 пг/мл, а время полувыведения - менее 2 часов.

### Показания к применению:

— снижение умственной активности, нарушение внимания и памяти, нарушение ориентации в пространстве, вызванные возрастными изменениями;

— цереброваскулярная недостаточность (в т.ч. вследствие церебрального атеросклероза);

— последствия нарушения мозгового кровообращения;

— профилактика мигрени;

— вестибулярные и лабиринтные нарушения (головокружение, шум в ушах, гипоакузия) ишемического генеза;

— болезнь Меньера;

— ретинопатия (диабетическая и гипертоническая);

— нарушения периферического артериального кровообращения (синдром и болезнь Рейно);

— венозная недостаточность.

### Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Гипертония](#)
- [Головокружение](#)
- [Мигрень](#)
- [Нарушение внимания](#)
- [Нарушение мозгового кровообращения](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)

### Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Внутрь (во время еды, с небольшим количеством жидкости) по 1/2-1 таблетке 2 раза в день. Продолжительность курса лечения 2-3 месяца, при необходимости курсы лечения можно повторять.

### Побочное действие:

*Со стороны ЖКТ:* тошнота, гастралгия, диспепсия, при этих проявлениях отмена препарата не требуется.

*Редко (не более 1 % случаев)* - головокружение, возбуждение, головная боль.

*Очень редко (не более 0,1 % случаев)* возможны аллергические реакции, тахикардия, гипотензия.

## **Передозировка:**

*Симптомы* - усиление выраженности побочных эффектов. *Лечение* симптоматическое.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Нет клинических данных о применения Вазобрала в период беременности и кормления грудью.

Применение препарата в период грудного вскармливания может приводить к уменьшению лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном назначении Вазобрала и гипотензивных препаратов возможно развитие артериальной гипотонии.

Кофеин ослабляет действие снотворных средств.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Вазобрал оказывает вазодилатирующее действие, не влияя на системное артериальное давление. Назначение Вазобрала больным с артериальной гипертензией не исключает необходимость применения антигипертензивных средств.

Содержащийся в препарате кофеин может вызвать нарушение сна, тахикардию.

## **Условия хранения:**

Список Б. При температуре 15-25°C, в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

4 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Vazobral\\_tabletki](http://drugs.thead.ru/Vazobral_tabletki)