

Вазобрал (таблетки)



Код АТХ:

- [C04AE51](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Дигидроэргокриптин](#)
- [Кофеин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки практически белого цвета, круглые, плоские, со скошенным краем, с риской на одной стороне и штампом "VASOBRAL" - на другой.

	1 таб.
альфа-дигидроэргокриптина мезилат	4 мг
кофеин	40 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. α -дигидроэргокриптин - дигидрированное производное спорыньи, блокирует α_1 и α_2 адренорецепторы. Оказывает допаминергическое, серотонинергическое действие, уменьшает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, снижает проницаемость сосудистой стенки, увеличивает количество функционирующих капилляров, улучшает кровообращение и процессы метаболизма в головном мозге, повышает устойчивость тканей мозга к гипоксии.

Кофеин обладает психостимулирующим и аналептическим действием, усиливает процессы возбуждения в коре головного мозга - повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает усталость и сонливость, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры,

оказывает диуретическое действие.

Фармакокинетика

При пероральном приеме, всасывание дигидроэргокриптина ускоряется в присутствии кофеина ($T_{\max}$ - 0,5 часа).

Максимальная концентрация после приема внутрь 8 мг α -дигидроэргокриптина составляет 227 пг/мл, а время полувыведения - менее 2 часов.

Показания к применению:

— снижение умственной активности, нарушение внимания и памяти, нарушение ориентации в пространстве, вызванные возрастными изменениями;

— цереброваскулярная недостаточность (в т.ч. вследствие церебрального атеросклероза);

— последствия нарушения мозгового кровообращения;

— профилактика мигрени;

— вестибулярные и лабиринтные нарушения (головокружение, шум в ушах, гипоакузия) ишемического генеза;

— болезнь Меньера;

— ретинопатия (диабетическая и гипертоническая);

— нарушения периферического артериального кровообращения (синдром и болезнь Рейно);

— венозная недостаточность.

Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Гипертония](#)
- [Головокружение](#)
- [Мигрень](#)
- [Нарушение внимания](#)
- [Нарушение мозгового кровообращения](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь (во время еды, с небольшим количеством жидкости) по 1/2-1 таблетке 2 раза в день. Продолжительность курса лечения 2-3 месяца, при необходимости курсы лечения можно повторять.

Побочное действие:

Со стороны ЖКТ: тошнота, гастралгия, диспепсия, при этих проявлениях отмена препарата не требуется.

Редко (не более 1 % случаев) - головокружение, возбуждение, головная боль.

Очень редко (не более 0,1 % случаев) возможны аллергические реакции, тахикардия, гипотензия.

Передозировка:

Симптомы - усиление выраженности побочных эффектов. *Лечение* симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет клинических данных о применения Вазобрала в период беременности и кормления грудью.

Применение препарата в период грудного вскармливания может приводить к уменьшению лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном назначении Вазобрала и гипотензивных препаратов возможно развитие артериальной гипотонии.

Кофеин ослабляет действие снотворных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Вазобрал оказывает вазодилатирующее действие, не влияя на системное артериальное давление. Назначение Вазобрала больным с артериальной гипертензией не исключает необходимость применения антигипертензивных средств.

Содержащийся в препарате кофеин может вызвать нарушение сна, тахикардию.

Условия хранения:

Список Б. При температуре 15-25°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vazobral_tabletki?page=1