

Вазокет



Код АТХ:

- [C05CA03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диосмин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки продолговатые, от серовато-желтого до светло-желтого цвета с линией разлома с двух сторон.

| | |
|---------|---------------|
| | 1 таб. |
| диосмин | 600 мг |

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, магния стеарат, повидон, целлюлоза микрокристаллическая.

15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Диосмин обладает вентонизирующим действием (уменьшает растяжимость вен), повышает тонус вен (дозозависимый эффект), уменьшает венозный застой, улучшает лимфатический дренаж (повышает тонус и частоту сокращения лимфатических капилляров, увеличивает их функциональную плотность, снижает лимфатическое давление), улучшает микроциркуляцию (повышает резистентность капилляров /дозозависимый эффект/, уменьшает их проницаемость), уменьшает адгезию лейкоцитов к венозной стенке и их миграцию в паравенозные ткани, улучшает диффузию кислорода и перфузию в кожной ткани, обладает противовоспалительным действием. Усиливает сосудосуживающее действие адреналина, норадреналина, серотонина, блокирует выработку свободных радикалов, синтез простагландинов и тромбксана.

Фармакокинетика

Всасывание

Вазокет

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

После приема внутрь препарат быстро всасывается из ЖКТ и определяется в плазме крови через 2 ч. C_{max} в плазме крови достигается через 5 ч после приема.

Распределение

Равномерно распределяется и накапливается во всех слоях стенки полых вен и подкожных вен нижних конечностей, в меньшей степени - в почках, печени, легких и других органах. Избирательное накопление диосмина и/или его метаболитов в венозных сосудах достигает максимума к 9 ч после приема и сохраняется в течение 96 ч.

Выведение

Выводится с мочой 79%, с калом - 11%, с желчью - 2.4%.

Показания к применению:

- варикозное расширение вен нижних конечностей;
- хроническая лимфо-венозная недостаточность нижних конечностей;
- обострение геморроя;
- нарушения микроциркуляции.

Относится к болезням:

- [Варикоз](#)
- [Венозная недостаточность](#)
- [Геморрой](#)
- [Лимфома](#)
- [Нарушения микроциркуляции](#)

Противопоказания:

- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *варикозном расширении вен нижних конечностей и в начальной стадии хронической лимфо-венозной недостаточности* (тяжесть в ногах) назначают по 1 таб./сут утром до завтрака в течение 2 мес, при *тяжелых формах хронической лимфо-венозной недостаточности* (отеки, боли, судороги) лечение продолжают в течение 3-4 мес, при *наличии трофических изменений и язв* лечение продлевают до 6 мес и более. Курс повторяют через 2-3 мес.

При *обострении геморроя* назначают препарат по 2-3 таб./сут во время приема пищи в течение 7 дней, далее при необходимости можно продолжить по 1 таб. 1 раз/сут в течение 1-2 мес.

При *лечении хронической лимфо-венозной недостаточности во II и III триместрах беременности* назначают по 1 таб. 1 раз/сут и отменяют за 2-3 недели до родов. В случае пропуска одного или нескольких приемов следует продолжать применение препарата в обычной дозировке.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - диспепсия.

Со стороны ЦНС: редко - головная боль.

Передозировка:

Симптомы передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

До сих пор в клинической практике не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении препарата у беременных.

В *экспериментальных исследованиях* не было выявлено тератогенного воздействия на плод.

Во время грудного вскармливания не рекомендуется прием препарата, т.к. отсутствуют данные о проникновении препарата в грудное молоко.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых эффектов взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение обострения геморроя проводят в комплексе с другими препаратами, при отсутствии быстрого клинического эффекта необходимо провести дополнительное обследование и скорректировать проводимую терапию.

Имеются данные о возможной эффективности препарата при лечении фетоплацентарной недостаточности, для профилактики кровотечений, возникающих при применении внутриматочных спиралей и в период флебэктомии.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vazoket>