

[Вектрум кальций](#)



Код АТХ:

- [A11AA03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Минералы](#)
- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки жевательные** плоскоцилиндрические, с фаской, от белого до белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета с наличием вкраплений серого цвета, с характерным фруктовым запахом.

	1 таб.
колекальциферол (вит. D ₃)	200 МЕ
фитоменадион (вит. K ₁)	200 мкг
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В ₆)	2.4 мг
кальций (в форме кальция карбоната)	200 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, сорбитол, аспартам, ароматизатор порошкообразный с фруктовым запахом, магния стеарат, кислота лимонная безводная.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный поливитаминный препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора в организме. Восполняет недостаток кальция и витамина D₃ в организме.

Кальций участвует в формировании костной ткани, минерализации зубов, свертывании крови, в регуляции процессов нервной проводимости и мышечных сокращений, в поддержании стабильной сердечной деятельности.

Колекальциферол (витамин D₃) регулирует обмен кальция и фосфора в организме, способствует полноценному

усвоению кальция.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Вектрум Кальций не предоставлены.

Показания к применению:

Лечение и профилактика состояний, сопровождающихся дефицитом кальция и витамина D₃ в организме:

- профилактика и комплексная терапия остеопороза и его осложнений (переломы костей);
- восполнение дефицита кальция и витамина D₃ у лиц пожилого возраста.

Относится к болезням:

- [Остеопороз](#)

Противопоказания:

- гиперкальциемия;
- гиперкальциурия;
- нефролитиаз (образование кальциевых камней);
- почечная недостаточность;
- остеопороз, обусловленный длительной иммобилизацией;
- фенилкетонурия;
- гипервитаминоз D₃;
- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

В качестве профилактического средства **взрослым** назначают по 1 таб. 1 раз/сут.

При *остеопорозе* режим дозирования и продолжительность курса терапии устанавливают индивидуально.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: запор, диарея, метеоризм, тошнота, боли в животе.

Со стороны обмена веществ: при длительном применении - гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, полиурия, запор, боли в эпигастральной области, гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Лечение: промывание желудка; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата Вектрум Кальций при беременности и в период лактации не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Активность витамина D₃ может снижаться при его одновременном применении с фенитоином и барбитуратами.

Одновременное применение Вектрум Кальция и сердечных гликозидов приводит к усилению действия последних (необходим контроль ЭКГ и клинического состояния пациента).

При одновременном назначении Вектрум Кальция и антибиотиков из группы тетрациклина интервал между приемом препаратов должен быть не менее 3 ч, т.к. кальций и витамин D₃ увеличивают всасывание тетрациклинов из ЖКТ.

ГКС уменьшают всасываемость кальция.

Сочетанное применение Вектрум Кальция и тиазидоподобных диуретиков увеличивает риск возникновения гиперкальциемии за счет усиления обратного всасывания кальция из просвета почечных канальцев. Фуросемид и другие "петлевые" диуретики, наоборот, увеличивают выведение кальция почками.

Особые указания и меры предосторожности:

При повышении концентрации кальция и креатинина в сыворотке крови следует снизить дозу или временно прекратить прием препарата.

Во избежание передозировки необходимо учитывать дополнительное поступление витамина D₃ из других источников. Не рекомендуется применять одновременно с витаминно-минеральными комплексами, содержащими кальций и витамин D₃.

При приеме препарата следует учитывать, что кислая реакция пищевых продуктов увеличивает, а слабощелочная - уменьшает всасывание кальция.

Контроль лабораторных показателей

При длительном применении препарата Вектрум Кальций необходим контроль содержания кальция в моче, кальция и креатинина в сыворотке крови.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат рекомендуется хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 2 года.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vektrum_Kalciy?page=1