Вектрум кальций



Код АТХ:

- A11AA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки жевательные*** плоскоцилиндрические, с фаской, от белого до белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета с наличием вкраплений серого цвета, с характерным фруктовым запахом.

	1 таб.
колекальциферол (вит. D_3)	200 МЕ
фитоменадион (вит. K_1)	200 мкг
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	2.4 мг
кальций (в форме кальция карбоната)	200 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, сорбитол, аспартам, ароматизатор порошкообразный с фруктовым запахом, магния стеарат, кислота лимонная безводная.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный поливитаминный препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора в организме. Восполняет недостаток кальция и витамина D_3 в организме.

Кальций участвует в формировании костной ткани, минерализации зубов, свертывании крови, в регуляции процессов нервной проводимости и мышечных сокращений, в поддержании стабильной сердечной деятельности.

Колекальциферол (витамин D_3) регулирует обмен кальция и фосфора в организме, способствует полноценному

усвоению кальция.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Вектрум Кальций не предоставлены.

Показания к применению:

Лечение и профилактика состояний, сопровождающихся дефицитом кальция и витамина D_3 в организме:

— профилактика и комплексная терапия остеопороза и его осложнений (переломы костей);

— восполнение дефицита кальция и витамина D_3 у лиц пожилого возраста.

Относится к болезням:

- Остеопороз

Противопоказания:

— гиперкальциемия;

— гиперкальциурия;

— нефролитиаз (образование кальциевых камней);

— почечная недостаточность;

— остеопороз, обусловленный длительной иммобилизацией;

— фенилкетонурия;

— гипервитаминоз D_3;

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

В качестве профилактического средства **взрослым** назначают по 1 таб. 1 раз/сут.

При *остеопорозе* режим дозирования и продолжительность курса терапии устанавливают индивидуально.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: запор, диарея, метеоризм, тошнота, боли в животе.

Со стороны обмена веществ: при длительном применении - гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, полиурия, запор, боли в эпигастральной области, гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Лечение: промывание желудка; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата Вектрум Кальций при беременности и в период лактации не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Активность витамина D_3 может снижаться при его одновременном применении с фенитоином и барбитуратами.

Одновременное применение Вектрум Кальция и сердечных гликозидов приводит к усилению действия последних (необходим контроль ЭКГ и клинического состояния пациента).

При одновременном назначении Вектрум Кальция и антибиотиков из группы тетрациклина интервал между приемом препаратов должен быть не менее 3 ч, т.к. кальций и витамин D_3 увеличивают всасывание тетрациклинов из ЖКТ.

ГКС уменьшают всасываемость кальция.

Сочетанное применение Вектрум Кальция и тиазидоподобных диуретиков увеличивает риск возникновения гиперкальциемии за счет усиления обратного всасывания кальция из просвета почечных канальцев. Фуросемид и другие "петлевые" диуретики, наоборот, увеличивают выведение кальция почками.

Особые указания и меры предосторожности:

При повышении концентрации кальция и креатинина в сыворотке крови следует снизить дозу или временно прекратить прием препарата.

Во избежание передозировки необходимо учитывать дополнительное поступление витамина D_3 из других источников. Не рекомендуется применять одновременно с витаминно-минеральными комплексами, содержащими кальций и витамин D_3.

При приеме препарата следует учитывать, что кислая реакция пищевых продуктов увеличивает, а слабощелочная - уменьшает всасывание кальция.

Контроль лабораторных показателей

При длительном применении препарата Вектрум Кальций необходим контроль содержания кальция в моче, кальция и креатинина в сыворотке крови.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат рекомендуется хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vektrum_kalciy