Венабос



Код АТХ:

- B01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гепарин натрия
- Эссенциальные фосфолипиды
- Эсцин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Гель для наружного применения прозрачный, светло-желтого цвета, с характерным запахом.

	1 г
эсцин	10 мг
"эссенциальные" фосфолипиды	10 мг
гепарин натрия	100 МЕ

Вспомогательные вещества: изопропанол 300 мг, глицерол 85% 20 мг, троламин 10.8 мг, бактерицид МВ 10 мг, карбомер 940 8 мг, одеколон 0.7 мг, масло розмарина 0.4 мг, масло лавандовое 0.4 мг, вода до 1 г.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает местное антикоагулянгное, противовоспалительное, венотонизирующее и антиагрегантное действие, снижает проницаемость вен, улучшает микроциркуляцию.

Гепарин натрия - антикоагулянт прямого действия; благодаря инактивации биогенных аминов и блокированию лизосомальных ферментов в ткани, проявляет противовоспалительное действие, ускоряет растворение микротромбов в области подкожных капилляров, препятствует тромбообразованию, активирует фибринолитическую систему; улучшает микроциркуляцию, способствует регенерации соединительной ткани за счет угнетения активности гиалуронидазы.

Фосфолипиды снижают вязкость крови благодаря влиянию на метаболизм жиров, снижают процессы агрегации тромбоцитов.

Эсцин - венотонизирующее средство растительного происхождения. Препятствует активации лизосомальных ферментов, расщепляющих протеогликан, повышает тонус венозной стенки, устраняет венозный застой; уменьшает проницаемость и ломкость капилляров. Уменьшает экссудацию, снижает выпот жидкости в ткани и ускоряет рассасывание существующего отека. Тормозит процессы воспаления, улучшает микроциркуляцию, способствует репарации органов и тканей.

Фармакокинетика

Сведения по фармакокинетике эсцина и фосфолипидов при наружном применении отсутствуют. Гепарин натрия при местном применении быстро проникает через эпидермис и накапливается в верхних слоях кожи. Незначительное количество гепарина натрия абсорбируется с поверхности кожи в системный кровоток (менее 0,2% от общего нанесенного количества). C_{max} в крови отмечается через 8 ч после аппликации. Гепарин натрия выводится в основном с мочой Период $T_{1/2}$ составляет 12 ч. После абсорбции биотрансформируется в печени и в ретикулоэндотелиальной системе.

Показания к применению:

— варикозная болезнь с симптоматикой в виде боли, отеков, чувства тяжести в ногах, ночных судорог икроножных мышц;

— флебит, тромбофлебит;

— посттравматические и послеоперационные гематомы без нарушения целостности кожных покровов.

Относится к болезням:

- Варикоз
- Варикозная болезнь
- Гематомы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Флебит

Противопоказания:

— геморрагический диатез (в т.ч. тромбоцитопеническая пурпура);

— гемофилия;

— нарушение целостности кожных покровов;

— возраст до 18 лет;

— не применяют на облучаемых участках кожи;

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Гель наносят на участок поражения, не втирая в кожу, 2-4 раза в сутки ежедневно до исчезновения симптомов. Продолжительность лечения — не более 15 дней. Возможность проведения более длительного курса лечения определяется врачом.

Побочное действие:

Аллергические реакции: крапивница, кожная сыпь, кожный зуд.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности возможно только в тех случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода. Применение в III триместре беременности противопоказано.

При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат нельзя наносить на кожу одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания в глаза и слизистые оболочки.

При развитии аллергических реакций пациент должен немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Venabos