

Венитан форте



Код АТХ:

- [C05BA53](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гепарин натрия](#)
- [Эсцин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Гель для наружного применения** бесцветный или слегка опалесцирующий, прозрачный, гомогенный.

	1 г
эсцин (β-эсцин аморфный)	10 мг
гепарин натрия	100 МЕ

Вспомогательные вещества: декспантенол, аллантоин порошкообразный, метилпарагидроксibenзоат натрия, натрия гидроксид, карбопол 934Р (карбоксиполиметилпарагиен), симетикона эмульсия, пропиленгликоль, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения, содержит венотонизирующее средство и прямой антикоагулянт.

Эсцин содержится в семенах конского каштана (*Aesculus hippocastanum* L., semen), представляет собой смесь тритерпеновых сапонинов. Эсцин оказывает противовоспалительное действие в основном в начальной фазе воспалительной реакции, уплотняя стенки капилляров и снижая, таким образом, их проницаемость, повышенную при воспалении. Эсцин также оказывает положительное влияние при ломкости стенок капилляров и повышает тонус венозных стенок при его ослаблении. Все это приводит к уменьшению застоя в венозном русле и накопления жидкости в тканях, препятствуя появлению отеков.

Гепарин препятствует свертыванию крови, что уменьшает тромбообразование в сосудах, а также оказывает

противовоспалительное действие.

Декспантенол и аллантаин улучшают всасывание активных веществ через кожу и, таким образом, усиливают их лечебное действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Венитан форте не предоставлены.

Показания к применению:

- венозная недостаточность (боли и чувство тяжести в ногах, ночные судороги в икроножных мышцах, кожный зуд, отечность ног);
- варикозное расширение вен;
- травмы (ушибы, отек мягких тканей, посттравматические гематомы, растяжение связок);
- тромбофлебит поверхностных вен.

Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Гематомы](#)
- [Зуд](#)
- [Растяжение](#)
- [Судороги](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют наружно.

Тонкий слой геля Венитан форте следует нанести на кожу пораженных участков и вокруг них и осторожно втереть. Гель следует наносить 1-3 раза/сут. Необходимое количество геля, соответствующее разовой дозе, следует наносить не сразу, а постепенно, небольшими порциями.

При *воспалительных заболеваниях вен* гель не втирают.

При *трофических язвах голени* следует смазать гелем края язвы, где нарушено кровообращение; при этом следует соблюдать осторожность, чтобы гель не попал непосредственно на поверхность язвы.

При *варикозном расширении вен нижних конечностей* рекомендуется также применять эластичный бинт или носить специальные стягивающие колготы.

Побочное действие:

Аллергические реакции: в отдельных случаях - крапивница, кожная сыпь, кожный зуд.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Венитан форте отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Ограничений применения по показаниям при беременности или грудном вскармливании нет. В связи с низкой степенью всасывания активных веществ, входящих в состав геля, они не оказывают системного действия. Необходимость назначения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) врач определяет индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Венитан форте нельзя наносить на пораженные участки кожи одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

Особые указания и меры предосторожности:

Не наносить препарат на кровоточащие язвы голени, на поврежденную или воспаленную кожу, на слизистые оболочки, а также при наличии гнойных процессов.

При развитии аллергических реакций пациент должен немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Venitan_Forte?page=1