

Венитан Н



Код АТХ:

- [C05CX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Каштана конского семян экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения 5%** светло-желтого цвета с коричневым оттенком, гомогенный.

	1 г
сухой экстракт семян каштана конского	50 мг,
что соответствует содержанию бета-эсцина	10 мг

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат - 0.1 мг, сорбиновая кислота - 2 мг, глицерил моностеарат - 18 мг, вазелин белый - 192 мг, масло минеральное - 18 мг, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт - 60%, стеариловый спирт - 40%; ланетте О) - 54 мг, глицерил каприлокапрат (миглиол 812) - 12 мг, пропиленгликоль - 30 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил 200) - 0.6 мг, гизтеллоза (гидроксиэтилцеллюлоза, полимер JR - 400 UC) - 15 мг, симетикон - 1 мг, полисорбат 40 (твин 40) - 48 мг, вода очищенная - до 1 г.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Эсцин содержится в семенах конского каштана (*Aesculus hippocastanum L., semen*). Представляет собой смесь тритерпеновых сапонинов. Эсцин оказывает противовоспалительное действие, в основном, в начальной фазе воспалительной реакции, «уплотняет» стенки капилляров и снижая, таким образом, их проницаемость, повышенную при воспалении. Эсцин также оказывает положительное влияние при ломкости стенок капилляров и повышает тонус венозных стенок при его ослаблении. Все это приводит к уменьшению застоя в венозном русле и накопления жидкости в тканях, препятствуя появлению отеков.

Показания к применению:

— венозная недостаточность (боли и чувство тяжести в ногах, ночные судороги в икроножных мышцах, кожный зуд, отечность ног), ощущение тяжести в ногах при беременности или длительном стоянии;

— варикозное расширение вен;

— травмы (ушибы, отек мягких тканей, посттравматические гематомы, растяжение связок), инфильтраты после инъекций.

Относится к болезням:

- [Варикоз](#)
- [Венозная недостаточность](#)
- [Гематомы](#)
- [Зуд](#)
- [Инфильтраты](#)
- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

С осторожностью. Склонность к тромбозам.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Тонкий слой крема следует нанести на кожу болезненных участков и вокруг них и осторожно втереть. Крем следует наносить 2-3 раза в сут.

При варикозном расширении вен нижних конечностей рекомендуется также применять эластичный бинт или носить специальные стягивающие колготы.

Побочное действие:

В очень редких случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности (крапивница, кожная сыпь, кожный зуд). В этих случаях следует немедленно прекратить лечение и обратиться к врачу.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата ВенитанН отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Ограничений применения при беременности или грудном вскармливании нет. В связи с ограниченной степенью всасывания лекарственных веществ, входящих в состав крема, они не оказывают системного действия. Вместе с тем, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не отмечено.

Особые указания и меры предосторожности:

Венитан Н

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Не следует наносить крем на поврежденную кожу, слизистые оболочки, а также при наличии гнойных процессов. Не массировать при нанесении. При внезапном появлении сильно выраженных симптомов венозной недостаточности (отек, изменение цвета кожи, ощущение напряжения и боль), особенно на одной ноге, следует исключить тромбоз вен нижних конечностей. При появлении упомянутых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Venitan_N