Венитан форте



Код АТХ:

- C05BA53

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гепарин натрия
- Эсцин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** бесцветный или слегка опалесцирующий, прозрачный, гомогенный.

	1 г
эсцин (β-эсцин аморфный)	10 мг
гепарин натрия	100 МЕ

Вспомогательные вещества: декспантенол, аллантоин порошкообразный, метилпарагидроксибензоат натрия, натрия гидроксид, карбопол 934Р (карбоксиполиметилпарагиен), симетикона эмульсия, пропиленгликоль, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения, содержит венотонизирующее средство и прямой антикоагулянт.

Эсцин содержится в семенах конского каштана (Aesculus hippocastanum L., semen), представляет собой смесь тритерпеновых сапонинов. Эсцин оказывает противовоспалительное действие в основном в начальной фазе воспалительной реакции, уплотняя стенки капилляров и снижая, таким образом, их проницаемость, повышенную при воспалении. Эсцин также оказывает положительное влияние при ломкости стенок капилляров и повышает тонус венозных стенок при его ослаблении. Все это приводит к уменьшению застоя в венозном русле и накопления жидкости в тканях, препятствуя появлению отеков.

Гепарин препятствует свертыванию крови, что уменьшает тромбообразование в сосудах, а также оказывает

противовоспалительное действие.

Декспантенол и аллантоин улучшают всасывание активных веществ через кожу и, таким образом, усиливают их лечебное действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Венитан форте не предоставлены.

Показания к применению:

— венозная недостаточность (боли и чувство тяжести в ногах, ночные судороги в икроножных мышцах, кожный зуд, отечность ног);

— варикозное расширение вен;

— травмы (ушибы, отек мягких тканей, посттравматические гематомы, растяжение связок);

— тромбофлебит поверхностных вен.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Гематомы
- Зуд
- Растяжение
- Судороги
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют наружно.

Тонкий слой геля Венитан форте следует нанести на кожу пораженных участков и вокруг них и осторожно втереть. Гель следует наносить 1-3 раза/сут. Необходимое количество геля, соответствующее разовой дозе, следует наносить не сразу, а постепенно, небольшими порциями.

При *воспалительных заболеваниях вен* гель не втирают.

При *трофических язвах голени* следует смазать гелем края язвы, где нарушено кровообращение; при этом следует соблюдать осторожность, чтобы гель не попал непосредственно на поверхность язвы.

При *варикозном расширении вен нижних конечностей* рекомендуется также применять эластичный бинт или носить специальные стягивающие колготы.

Побочное действие:

Аллергические реакции: в отдельных случаях - крапивница, кожная сыпь, кожный зуд.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Венитан форте отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Ограничений применения по показаниям при беременности или грудном вскармливании нет. В связи с низкой степенью всасывания активных веществ, входящих в состав геля, они не оказывают системного действия. Необходимость назначения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) врач определяет индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Венитан форте нельзя наносить на пораженные участки кожи одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

Особые указания и меры предосторожности:

Не наносить препарат на кровоточащие язвы голени, на поврежденную или воспаленную кожу, на слизистые оболочки, а также при наличии гнойных процессов.

При развитии аллергических реакций пациент должен немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Venitan_forte