Вентеро-Нова



Код АТХ:

- A02BX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой от светло-зеленого до зеленовато-серого цвета, круглые, двояковыпуклые. На изломе - два слоя. Внешний - оболочка от светло-зеленоватого до зеленовато-серого цвета. Внутренний - от светло-коричневого с зеленоватым оттенком до темно-коричневого с зеленоватым оттенком цвета.

	1 таб.
сепии съедобной грудной щит	156 мг
рябчика хубэйского луковицы	78 мг
меллии тоозендан плоды	78 мг
коптиса китайского корневища	39 мг
абрикоса обыкновенного семена	39 мг
хохлатки яньхусо корневища	39 мг
хурмы восточной семена	39 мг
эводии рутоплодной плоды	20 мг
алойного дерева китайского смола	11.96 мг

Вспомогательные вещества: сахароза 5.46 мг, тальк 3.58 мг, гидроксиметилцеллюлоза 3.38 мг, полиакрилат 3.2 мг, титана диоксид 2 мг, полисорбат-80 2 мг, хлорофилл медный 2 мг.

12 шт. - блистеры (2) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат природного происхождения, фармакологическое действие которого обусловлено совокупностью свойств входящих в его состав компонентов. Обладает антисекреторной и антацидной активностью, способствует стимуляции регенераторных процессов в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки; оказывает противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое действие; способствует улучшению моторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии хронического гастрита с повышенной секреторной активностью;

— хронического гастродуоденита;

— язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастродуоденит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— атрофический гастрит;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— возраст до 18 лет.

В состав препарата входит сахароза, в связи с чем его не следует применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или недостаточность сахаразы/изомальтазы.

Способ применения и дозы:

Внутрь взрослым по 3 таблетки 2-3 раза в день за 1 ч до еды или через 2 ч после еды. Курс лечения - 30 дней.

Побочное действие:

При применении препарата по указанным показаниям в рекомендованных дозировках побочные эффекты не выявлены. Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Запрещено принимать препарат во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

В состав препарата входит сахароза в количестве около 1% от массы таблетки, что следует учитывать лицам, страдающим сахарным диабетом. В 1 разовой дозе препарата (3 таблетки) содержится 0.01638 г сахарозы, что соответствует 0.00136 ХЕ.

В период лечения следует воздержаться от употребления чрезмерно кислых или острых продуктов питания и напитков.

Применение в детском возрасте

Запрещено принимать препарат детям до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре от 15 до 25°С, в сухом, защищенном orсвета месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности - 3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ventero-Nova