

Веремед



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мебеверин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Капсулы с пролонгированным высвобождением твердые желатиновые, №0, корпус капсулы прозрачный, крышечка капсулы красного цвета; содержимое капсул - пеллеты белого или почти белого цвета.

	1 капс.
мебеверина гидрохлорид	200 мг

Вспомогательные вещества: сахарная крупка (сахароза, патока крахмальная)- 90 мг, кремния диоксид коллоидный - 1 мг, тальк - 28 мг, титана диоксид - 6.1 мг, гипромеллоза - 5 мг, этилцеллюлоза - 17.3 мг, цетиловый спирт - 6.1 мг.

Сахарные пеллеты: сахарная крупка (сахароза, патока крахмальная) - 66 мг, этилцеллюлоза - 3.5 мг, тальк - 0.6 мг, титана диоксид - 0.7 мг, цетиловый спирт - 0.7 мг.

Твердая желатиновая капсула: желатин - 79.116 мг, натрия метилпарагидроксибензоат - 0.48 мг, натрия пропилпарагидроксибензоат - 0.096 мг, натрия бензоат - 0.096 мг, натрия лаурилсульфат - 0.192 мг, краситель пунцовый (Понсо 4R супра) - 1.67 мг, краситель азорубин (кармуазин супра) - 0.0192 мг, вода - 14.4 мг.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Спазмолитик миотропного действия. Понижает тонус и уменьшает сократительную активность гладкой мускулатуры ЖКТ (главным образом, толстого кишечника).

Фармакокинетика

При приеме внутрь подвергается пресистемному гидролизу и не обнаруживается в плазме. Метаболизируется в печени до вератровой кислоты и мебеверинового спирта. Выводится главным образом почками в виде метаболитов, в небольших количествах - желчью (полностью - в течение 24 ч).

Показания к применению:

Веремед

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Спастические состояния ЖКТ, обусловленные органическими заболеваниями. Симптоматическое лечение болей, спастических состояний, неприятных ощущений при синдроме раздраженного кишечника.

Противопоказания:

Беременность, повышенная чувствительность к мебеверину.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь по 100 мг 4 раза или по 135 мг 3 раза/сут. При достижении желаемого клинического эффекта дозу постепенно снижают в течение нескольких недель.

Побочное действие:

Диагнозы

- Аллергический дерматит у детей
- Коклюш
- Круп
- Лечение и профилактика недержания мочи у детей

Применение при беременности и кормлении грудью:

Мебеверин противопоказан к применению при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Veremed>