

## Веро-Пипемидин



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Уроантисептик, производное 4-хинолона. Оказывает бактерицидное действие, обусловленное связыванием ионов двухвалентного железа и ингибированием ферментных систем микробной клетки.

Активен в отношении большинства грамотрицательных бактерий: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Salmonella spp.*

Активен также в отношении некоторых грамположительных бактерий, в частности *Staphylococcus aureus*.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь  $C_{max}$  в плазме крови достигается через 2 ч. Биодоступность составляет 60%, связывание с белками плазмы - 15%.  $T_{1/2}$  - 3 ч. С мочой выводится 50-70%.

### **Показания к применению:**

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами (в т.ч. пиелонефрит, уретрит, цистит, простатит).

### **Относится к болезням:**

- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Простатит](#)
- [Уретрит](#)
- [Цистит](#)

### **Противопоказания:**

Выраженные нарушения функции почек ( $KK < 10$  мл/мин), выраженные нарушения функции печени, I и III триместры беременности, детский возраст, повышенная чувствительность к пипемидовой кислоте.

**Способ применения и дозы:**

При приеме внутрь - по 400 мг 2 раза/сут в течение 10 дней. В отдельных случаях разовая доза может быть увеличена до 600 мг.

При частых острых инфекциях мочевыводящих путей у женщин, одновременно с пероральным лечением вводят интравагинально.

**Побочное действие:**

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Пипемидовая кислота противопоказана к применению в I и III триместрах беременности. Применение во II триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания) необходимо проводить с осторожностью, только в случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск развития побочных эффектов у плода или ребенка.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении с препаратами, ощелачивающими мочу, активность пипемидовой кислоты усиливается.

**Особые указания и меры предосторожности:**

В процессе лечения следует избегать ультрафиолетового облучения в связи с высоким риском возникновения фотосенсибилизации; увеличить количество потребляемой жидкости (под контролем диуреза).

**При нарушениях функции почек**

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек (КК<10 мл/мин).

**При нарушениях функции печени**

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени.

**Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vero-Pipemidin>