

Вертигохель



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капли для приема внутрь гомеопатические** бесцветные или слабо светло-желтого цвета, прозрачные, с запахом этанола, иногда со специфическим запахом кониума.

	100 г
Anamirta cocculus (Cocculus) (анамирта коккулюс (коккулюс)) D4	70 г
Petroleum rectificatum (петролеум ректификатум) D8	10 г
Ambra grisea (Ambra) (амбра гризеа (амбра)) D6	10 г
Conium maculatum (Conium) (кониум макулятум (кониум)) D3	10 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— головокружения различного происхождения, в т.ч. головокружения, связанные с укачиванием в транспорте.

Относится к болезням:

- [Головокружение](#)

Противопоказания:

- беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных);
- детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

По 10 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день.

При *острых внезапных приступах головокружений и тошноты* принимать сначала по 10 капель каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2-3 недели. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом принимать по 10 капель каждые 15 мин за 1 час до поездки и во время поездки.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с недостаточностью клинических данных противопоказано назначение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2-3 недель следует обратиться к врачу.

Разовая доза взрослого содержит около 0.035 г абсолютного спирта этилового, максимальная суточная доза - 0.28 г этанола.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

В связи с недостаточностью клинических данных не назначают детям в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Не применять препарат по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vertigohel>