# Вертигохель (таблетки)



#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◊ Таблетки для рассасывания гомеопатические от белого до желтовато-белого цвета, круглые,

плоскоцилиндрические, с фаской; запах практически отсутствует.

	1 таб.
Anamirta cocculus (Cocculus) (анамирта коккулюс	210 мг
(коккулюс)) D4	
Conium maculatum (Conium) (кониум макулятум (кониум))	ВО мг
D3	
Ambra grisea (Ambra) (амбра гризеа (амбра)) D6	30 мг
Petroleum rectificatum (петролеум ректификатум) D8	30 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат - 1.5 мг, лактоза - до 0.302 г.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

# Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

#### Показания к применению:

- головокружения различного происхождения, в т.ч. головокружения, связанные с укачиванием в транспорте.

#### Относится к болезням:

• Головокружение

#### Противопоказания:

- беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных);
- детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. При *острых внезапных приступах головокружений и тошноте* сначала по 1 таблетке каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2-3 недели.

Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом - по 1 таблетке каждые 15 минут за 1 час до поездки и по мере необходимости в течение 1 часа во время поездки. Затем принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

При необходимости, после консультации с врачом, препарат может быть назначен в дозировке по 3 таблетки 3 раза в день.

При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

#### Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с недостаточностью клинических данных противопоказано назначение препарата при беременности и в период лактации.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

#### Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2-3 недель следует обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0.025 XE.

Беречь от влажности! Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

#### Вертигохель (таблетки)

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

Не влияет.

#### Применение в детском возрасте

В связи с недостаточностью клинических данных не назначают детям в возрасте до 18 лет.

### Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Не применять препарат по истечении срока годности.

# Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Vertigohel\_tabletki