Вг-5



Код АТХ:

- A05BA

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой красно-коричневого цвета, овальной формы, двояковыпуклые; ядро - серо-коричневого цвета с более светлыми вкраплениями.

	1 таб.
густой экстракт травы менирана* (10:1)	100 мг
густой экстракт травы аденосматиса голубого*(14:1)	130 мг
густой экстракт травы эклипты белой*(8:1)	50 мг
густой экстракт столбиков с рыльцами кукурузы*(16:1)	50 мг

Вспомогательные вещества: лактоза - 130 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 61.6 мг, поливинилпирролидон (повидон) - 6 мг, крахмал - 110 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 10 мг, магния стеарат - 6 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза - 9.33 мг, тальк - 9.33 мг, титана диоксид - 5 мг, макрогол 6000 - 2.8 мг, краситель коричневый (E155) - 0.63 мг.

* - экстрагент - этанол 90%

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, фармакологическая активность которого обусловлена свойствами входящих в его состав компонентов. Обладает выраженным гепатопротекторным действием, способствует восстановлению функционального и морфологического состояния гепатоцитов, снижает повышенную активность сывороточных ферментов (АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, щелочной фосфатазы), оказывает антиоксидантное действие. Кроме того, оказывает желчегонное действие, способствует нормализации состава желчи.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

— алкогольный стеатогепатит умеренной степени тяжести.

Противопоказания:

— склонность к тромбозам;

— недостаточность лактазы;

— непереносимость лактозы;

— глюкозо-галактозная мальабсорбция;

— беременность;

— период лактации;

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 2 таб. 2 раза/сут, за 30 мин до еды. Курс лечения - 6 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки описано не было.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно применение препарата со спазмолитиками и метоклопрамидом.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, следует учитывать, что содержание углеводов в разовой дозе препарата (2 таб.) составляет 0.0217 ХЕ, в суточной дозе (4 таб.) составляет 0.043 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vg-5