

## [Вг-5](#)



### Код АТХ:

- [A05BA](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** красно-коричневого цвета, овальной формы, двояковыпуклые; ядро - серо-коричневого цвета с более светлыми вкраплениями.

	<b>1 таб.</b>
густой экстракт травы менирана* (10:1)	100 мг
густой экстракт травы аденосматиса голубого*(14:1)	130 мг
густой экстракт травы эклипты белой*(8:1)	50 мг
густой экстракт столбиков с рыльцами кукурузы*(16:1)	50 мг

*Вспомогательные вещества:* лактоза - 130 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 61.6 мг, поливинилпирролидон (повидон) - 6 мг, крахмал - 110 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 10 мг, магния стеарат - 6 мг.

*Состав оболочки:* гипромеллоза - 9.33 мг, тальк - 9.33 мг, титана диоксид - 5 мг, макрогол 6000 - 2.8 мг, краситель коричневый (E155) - 0.63 мг.

\* - экстрагент - этанол 90%

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения, фармакологическая активность которого обусловлена свойствами входящих в его состав компонентов. Обладает выраженным гепатопротекторным действием, способствует восстановлению функционального и морфологического состояния гепатоцитов, снижает повышенную активность сывороточных ферментов (АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, щелочной фосфатазы), оказывает антиоксидантное действие. Кроме того, оказывает желчегонное действие, способствует нормализации состава желчи.

#### **Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

### **Показания к применению:**

— алкогольный стеатогепатит умеренной степени тяжести.

### **Противопоказания:**

- склонность к тромбозам;
- недостаточность лактазы;
- непереносимость лактозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- беременность;
- период лактации;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь, по 2 таб. 2 раза/сут, за 30 мин до еды. Курс лечения - 6 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка:**

До настоящего времени случаев передозировки описано не было.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Возможно применение препарата со спазмолитиками и метоклопрамидом.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, следует учитывать, что содержание углеводов в разовой дозе препарата (2 таб.) составляет 0.0217 ХЕ, в суточной дозе (4 таб.) составляет 0.043 ХЕ.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

**Условия хранения:**

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vg-5>