

## Виброцил



### **Код АТХ:**

- [R01AB01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Диметинден](#)
- [Фенилэфрин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>

[РЛС VITAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◊ **Капли назальные** в виде прозрачного раствора от бесцветного до слабо-желтого цвета, со слабым запахом лаванды.

	<b>1 мл</b>
фенилэфрин	2.5 мг
диметиндена малеат	250 мкг

*Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 50% раствора (в пересчете на бензалкония хлорид) - 0.2 мг (0.1 мг), лимонной кислоты моногидрат - 2.6 мг, натрия гидрофосфат - 4.4 мг, сорбитол - 35 мг, масло лаванды - 0.2 мг, вода - до 1 мл.*

15 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с крышкой-пипеткой - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Интермедианты](#)

### **Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика**

Препарат с сосудосуживающим и противоаллергическим действием для местного применения при заболеваниях ЛОР-органов.

**Фенилэфрин** - симпатомиметик, при местном применении оказывает умеренное сосудосуживающее действие (за счет стимуляции  $\alpha_1$ -адренорецепторов, расположенных в венозных сосудах слизистой оболочки носа), устраняет отек слизистой оболочки носа и его придаточных пазух.

**Диметинден** - блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов. Оказывает противоаллергическое действие. Не снижает активность мерцательного эпителия слизистой оболочки носа.

**Фармакокинетика**

Виброцил предназначен для местного применения, и его активность не зависит от концентрации активных веществ в плазме крови.

**Показания к применению:**

- острый ринит (в т.ч. при простудных заболеваниях);
- аллергический ринит (в т.ч. при сенной лихорадке);
- вазомоторный ринит;
- хронический ринит;
- острый и хронический синусит;
- острый средний отит (в качестве вспомогательного средства);
- подготовка к хирургическим вмешательствам в области носа и устранение отека слизистой оболочки носа и придаточных пазух после хирургического вмешательства в этой области.

**Относится к болезням:**

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Лихорадка](#)
- [Отит](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

**Противопоказания:**

- атрофический ринит (в т.ч. со зловонным отделяемым - озена);
- одновременный прием ингибиторов МАО и период до 14 дней после их отмены;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат при сердечно-сосудистых заболеваниях (артериальной гипертензии, аритмиях, генерализованном атеросклерозе), заболеваниях щитовидной железы, закрытоугольной глаукоме, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, инсулинзависимом сахарном диабете.

С осторожностью следует назначать Виброцил пациентам с выраженными реакциями на симпатомиметики, такими как бессонница и головокружение.

**Способ применения и дозы:**

Перед применением препарата следует тщательно очистить полость носа.

**Взрослым и детям старше 6 лет** назначают по 3-4 капли в каждый носовой носовой ход 3-4 раза/сут.

**Детям в возрасте от 1 года до 6 лет** - по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

**Детям в возрасте до 1 года** - по 1 капле в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

Капли назальные закапывают в нос, запрокинув голову. Это положение головы сохраняют в течение нескольких минут.

## **Побочное действие:**

*Местные реакции:* редко - слабо выраженное и преходящее ощущение жжения и сухости слизистой оболочки носа.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* при случайном приеме Виброцила внутрь маленькими детьми не отмечено каких-либо серьезных побочных эффектов. В большинстве случаев симптомы передозировки отсутствовали, однако иногда сообщалось о таких симптомах, как чувство усталости, боль в области желудка, тахикардия, артериальная гипертензия, возбуждение, бессонница, бледность кожных покровов (чаще у детей при случайном приеме внутрь).

*Лечение:* применение активированного угля и, возможно, слабительного средства (промывание желудка не требуется); взрослым и детям в возрасте старше 6 лет показан прием большого количества жидкости. Специфического антидота нет.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Учитывая возможное системное сосудосуживающее действие, Виброцил не рекомендуется применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Фенилэфрин (как и другие сосудосуживающие средства) противопоказан больным, получающим ингибиторы МАО в данное время или получавшим их в течение 2 предыдущих недель.

Не следует назначать одновременно препарат с трициклическими антидепрессантами, бета-адреноблокаторами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Виброцил не следует применять более 1 недели без консультации с врачом. Длительное (более 2 недель) или чрезмерное применение препарата может вызвать тахифилаксию и эффект "рикошета" (медикаментозный ринит), привести к развитию системного сосудосуживающего действия.

Не следует превышать рекомендуемые дозы Виброцила. В противном случае возможно появление симптомов системного действия препарата.

### *Использование в педиатрии*

**У детей младше 6 лет** применяют только капли назальные.

### *Влияние на способность к управлению автотранспорта и управлению механизмами*

Виброцил не оказывает седативного действия (не влияет на скорость психомоторных реакций).

### **Применение в детском возрасте**

Детям старше 6 лет назначают по 3-4 капли в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет - по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

Детям в возрасте до 1 года - по 1 капле в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vibrocil>