Вибуркол



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные гомеопатические*** от белого до желтовато-белого цвета, торпедобразной формы; с очень слабым своеобразным запахом (без прогорклого запаха); на продольном срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

	1 супп.
Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D1	1.1 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D2	1.1 мг
Solanum dulcamara (Dulcamara) (солянум дулькамара (дулькамара)) D4	1.1 мг
Plantago major (Plantago) (плантаго майор (плантаго)) D3	1.1 мг
Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D2	2.2 мг
Calcium carbonicum Hahnemanni (Conchae) (кальциум карбоникум Ганемани (конхэ)) D8	4.4 мг

Вспомогательные вещества: жир твердый (Adeps soludis) - 1089 мг (до получения суппозитория массой 1.1 г).

6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии (как жаропонижающее и противовоспалительное средство) при лечении респираторных заболеваний у детей;

— для снятия клинических проявлений при прорезывании молочных зубов.

Относится к болезням:

- Жар

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Ректально. При *острых респираторных вирусных инфекциях и болезненных симптомах прорезывания молочных зубов* **детям до 6-ти месяцев** по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; **детям от 6 месяцев** при температуре тела свыше 37.5°С по 1 суппозиторию 4 раза в сутки; при температуре тела свыше 38°С по 1 суппозиторию до 6 раз в сутки. При нормализации температуры тела по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки еще 3-4 дня.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применяют у детей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Беречь от перегрева, прямого солнечного света и влажности!

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15°С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Viburkol