Видисик

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Карбомер

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель глазной 0.2%*** прозрачный, бесцветный, вязкий.

	1 г
карбомер	2 мг

Вспомогательные вещества: цетримид, сорбитол, натрия гидроксид, вода д/и.

10 г - тубы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат искусственной слезы. Капля препарата образует защитную увлажняющую пленку на роговице. Гель заменяет водную фазу слезной жидкости, имитирует муциновый слой, увлажняет конъюнктиву и роговицу. Препарат препятствует образованию повреждений эпителия и стимулирует его регенерацию.

Фармакокинетика

Препарат не проникает в глаз и не накапливается в тканях.

Показания к применению:

— недостаточная продукция слезной жидкости;

— синдром сухого глаза.

Относится к болезням:

- Синдром сухого глаза

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Гель глазной закапывают по 1 капле в нижний конъюнктивальный мешок каждого глаза 3-5 раз/сут в зависимости от тяжести и выраженности жалоб.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, преходящее затуманивание зрения, чувство жжения, раздражение глаз.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Видисик отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять Видисик при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В тех случаях, когда проводится дополнительная местная терапия, интервал между введением Видисика и других препаратов должен составлять не менее 5 мин. Видисик следует применять последним.

Особые указания и меры предосторожности:

В период применения препарата не рекомендуют ношение мягких контактных линз.

При ношении контактных линз их следует снять перед использованием геля и не устанавливать раньше чем через 15 мин после инстилляции препарата.

Тубу следует закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком тубы к глазу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2° до 30°С.

После вскрытия тюбика препарат следует использовать в течение 6 недель.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vidisik