Викаир



Код АТХ:

- A02BX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аира корневища
- Висмута субнитрат
- Крушины ольховидной кора
- Магния карбонат
- Натрия гидрокарбонат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное и спазмолитическое действие. Магния карбонат снижает кислотность желудочного сока, уменьшает активность пепсина. Висмута нитрат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие. Входящие в состав аир, обладающий спазмолитическим действием, и крушина, обладающая слабительным действием, способствуют улучшению пассажа по кишечнику.

Показания к применению:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит (с наклонностью к запору).

Относится к болезням:

- Гастрит
- Запор

Противопоказания:

Гиперчувствительность, гипоацидный гастрит, хроническая почечная недостаточность, хронический аппендицит, энтероколит, детский возраст.

Способ применения и дозы:

Внутрь, через 1-1.5 ч после еды, запивая небольшим количеством (1/4 стакана) воды, по 1-2 таб. 3 раза/сут. Средняя необходимая длительность лечения - 1-2 мес (при необходимости курс повторяют).

Побочное действие:

Возможно: жидкий стул, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На фоне приема м-холиноблокаторов или блокаторов гистаминовых H_2-рецепторов уменьшается потребность в применении препарата. Снижает всасывание тетрациклинов. В сочетании с другими лекарственными средствами, содержащими висмут, повышается концентрация висмута в крови.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо учитывать возможность развития энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в ЦНС при длительном применении в больших дозах.

В период лечения кал окрашивается в черный цвет.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vikair