

[Викаир](#)



Код АТХ:

- [A02BX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аира корневища](#)
- [Висмута субнитрат](#)
- [Крушины ольховидной кора](#)
- [Магния карбонат](#)
- [Натрия гидрокарбонат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное и спазмолитическое действие. Магния карбонат снижает кислотность желудочного сока, уменьшает активность пепсина. Висмута нитрат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие. Входящие в состав аир, обладающий спазмолитическим действием, и крушина, обладающая слабительным действием, способствуют улучшению пассажа по кишечнику.

Показания к применению:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит (с склонностью к запору).

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Запор](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность, гипоацидный гастрит, хроническая почечная недостаточность, хронический аппендицит, энтероколит, детский возраст.

Способ применения и дозы:

Внутрь, через 1-1.5 ч после еды, запивая небольшим количеством (1/4 стакана) воды, по 1-2 таб. 3 раза/сут. Средняя необходимая длительность лечения - 1-2 мес (при необходимости курс повторяют).

Побочное действие:

Возможно: жидкий стул, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На фоне приема м-холиноблокаторов или блокаторов гистаминовых H₂-рецепторов уменьшается потребность в применении препарата. Снижает всасывание тетрациклинов. В сочетании с другими лекарственными средствами, содержащими висмут, повышается концентрация висмута в крови.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо учитывать возможность развития энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в ЦНС при длительном применении в больших дозах.

В период лечения кал окрашивается в черный цвет.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vikair>