

## [Викаир](#)



### Код АТХ:

- [A02BX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аира корневища](#)
- [Висмута субнитрат](#)
- [Крушины ольховидной кора](#)
- [Магния карбонат](#)
- [Натрия гидрокарбонат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [Википедия](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#) <sup>англ</sup>

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### *Фармакодинамика*

Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное и спазмолитическое действие. Магния карбонат снижает кислотность желудочного сока, уменьшает активность пепсина. Висмута нитрат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие. Входящие в состав аир, обладающий спазмолитическим действием, и крушина, обладающая слабительным действием, способствуют улучшению пассажа по кишечнику.

### Показания к применению:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит (с склонностью к запору).

## Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Запор](#)

## Противопоказания:

Гиперчувствительность, гипоацидный гастрит, хроническая почечная недостаточность, хронический аппендицит, энтероколит, детский возраст.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, через 1-1.5 ч после еды, запивая небольшим количеством (1/4 стакана) воды, по 1-2 таб. 3 раза/сут. Средняя необходимая длительность лечения - 1-2 мес (при необходимости курс повторяют).

## Побочное действие:

*Возможно:* жидкий стул, аллергические реакции.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На фоне приема м-холиноблокаторов или блокаторов гистаминовых H<sub>2</sub>-рецепторов уменьшается потребность в применении препарата. Снижает всасывание тетрациклинов. В сочетании с другими лекарственными средствами, содержащими висмут, повышается концентрация висмута в крови.

## Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо учитывать возможность развития энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в ЦНС при длительном применении в больших дозах.

В период лечения кал окрашивается в черный цвет.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vikair>