

## [Викалин](#)



### Код АТХ:

- [A02BX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аира корневища](#)
- [Висмута субнитрат](#)
- [Келлин](#)
- [Крушины ольховидной кора](#)
- [Магния карбонат](#)
- [Натрия гидрокарбонат](#)
- [Рутозид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН [Википедия](#) МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#) англ

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное и спазмолитическое действие.

Магния карбонат и натрия гидрокарбонат снижают кислотность желудочного сока, уменьшают активность пепсина.

Висмута нитрат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие.

Входящие в состав аир и келлин оказывают спазмолитическое действие, крушина - слабительное.

## **Показания к применению:**

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гиперацидный гастрит.

## **Относится к болезням:**

- [Гастрит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

## **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- гипоацидный гастрит;
- почечная недостаточность.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь, через 0.5-1 ч после еды, с 1/2 стакана теплой воды, по 1-2 таб. (целесообразно предварительно измельчить) 3 раза/сут в течение 1-3 мес. После перерыва в 1 мес при необходимости лечение может быть продолжено.

## **Побочное действие:**

Диарея. Аллергические реакции.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Во время лечения препаратом кал окрашивается в темно-зеленый или черный цвет.

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при почечной недостаточности.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vikalin>