Викалин



Код АТХ:

- A02BX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аира корневища
- Висмута субнитрат
- Келлин
- Крушины ольховидной кора
- Магния карбонат
- Натрия гидрокарбонат
- Рутозид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное и спазмолитическое действие.

Магния карбонат и натрия гидрокарбонат снижают кислотность желудочного сока, уменьшают активность пепсина.

Висмута нитрат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие.

Входящие в состав аир и келлин оказывают спазмолитическое действие, крушина - слабительное.

Показания к применению:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— гиперацидный гастрит.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— гипоацидный гастрит;

— почечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, через 0.5-1 ч после еды, с 1/2 стакана теплой воды, по 1-2 таб. (целесообразно предварительно измельчить) 3 раза/сут в течение 1-3 мес. После перерыва в 1 мес при необходимости лечение может быть продолжено.

Побочное действие:

Диарея. Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения препаратом кал окрашивается в темно-зеленый или черный цвет.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vikalin