Викс Актив Бальзам С Ментолом И Эвкалиптом



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Камфора
- Левоментол
- Терпентиновое масло
- Эвкалиптовое масло

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] [мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения*** от белого до жетовато-белого цвета, с характерным запахом.

	100 г
левоментол	2.75 г
камфора	5 г
масло эвкалиптовое	1.5 г
масло терпентинное	5 г

Вспомогательные вещества: тимол - 0.25 г, кедровое масло - 0.45 г, парафин белый мягкий - до 100 г.

50 г - банки полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Оказывает местнораздражающее, противовоспалительное и антисептическое действие. Снижение степени заложенности носа при однократном нанесении препарата наблюдается до 8 ч.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся:

— насморком;

— чувством заложенности носа;

— кашлем и болью в горле.

Относится к болезням:

- Насморк

Противопоказания:

— склонность к ларинго- и бронхоспазму;

— бронхиальная астма;

— коклюш;

— ложный круп (острый стенозирующий ларинготрахеит);

— кашель, вызванный скоплением мокроты (слизи);

— продолжительный или хронический кашель, вызванный курением или эмфиземой;

— повреждения кожных покровов и кожные заболевания в области предполагаемого нанесения препарата;

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для наружного применения (растирания) у **взрослых и детей старше 2 лет**.

Мазь следует втирать легкими движениями 2-4 раза/сут в кожу груди при *насморке и заложенности носа*; в кожу шеи - при *кашле и боли в горле*; в кожу спины - при *кашле*. Продолжительность лечения в среднем до 5 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, ларингоспазм, бронхоспазм, раздражение кожи в области нанесения препарата, слезотечение.

Передозировка:

Симптомы: раздражение кожи в местах нанесения препарата, бронхоспазм, ларингоспазм.

Лечение: избыточное количество мази может быть удалено с помощью марлевой или бумажной салфетки, смоченной растительным маслом. При бронхо- или ларингоспазме пациент должен незамедлительно обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение препарата данной группе не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не проглатывать. Не наносить препарат на кожу в области носа и/или лица. Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки носа, полости рта. При случайном попадании мази в глаза и на слизистые оболочки рекомендуется обильное промывание водой.

Никогда не нагревать препарат и не применять его в нагретом состоянии.

После растирания одежда, покрывающая область нанесения препарата, не должна быть сильно затянута.

Если самочувствие не улучшается в течение 5 дней или становится хуже, пациент должен обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 2 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Viks_Aktiv_Balzam_s_mentolom_i_evkaliptom