

Виксипин



Код АТХ:

- [S01XA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Метилэтилпиридинол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр^{МНН}](#) [Википедия^{МНН}](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Капли глазные в виде прозрачной или почти прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости.

	1 мл
метилэтилпиридинола гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: гидроксипропилбетадекс - 20 мг, калия дигидрофосфат - 10.8 мг, натрия бензоат - 2 мг, натрия гиалуронат - 1.8 мг, натрия гидрофосфата дигидрат - 0.36 мг, динатрия эдетата дигидрат (трилон Б) - 0.2 мг, фосфорная кислота раствор 2 М - до pH 4.0-5.0, вода д/и - до 1 мл.

0.5 мл - тубики-капельницы (5) - пакеты (2) из фольгированной пленки - пачки картонные.

0.5 мл - тубики-капельницы (5) - пакеты (4) из фольгированной пленки - пачки картонные.

0.5 мл - тубики-капельницы (5) - пакеты (6) из фольгированной пленки - пачки картонные.

5 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ангиопротектор, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, является ингибитором свободнорадикальных процессов, антигипоксантом и антиоксидантом, уменьшает вязкость крови и агрегацию тромбоцитов.

Обладает ретинопротекторными свойствами, защищает сетчатку от повреждающего действия света высокой

интенсивности, способствует рассасыванию внутриглазных кровоизлияний, улучшает микроциркуляцию глаза.

Показания к применению:

Лечение - кровоизлияние в переднюю камеру глаза, осложнения миопии, защита роговицы (при ношении контактных линз); лечение и профилактика - воспаление и ожог роговицы, кровоизлияния в склеру пациентов пожилого возраста.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Кровоизлияния в переднюю камеру глаза](#)
- [Миопия](#)
- [Склерит](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

С *осторожностью* - беременность.

Способ применения и дозы:

В конъюнктивальный мешок - по 1-2 капли 2-3 раза в день. Длительность лечения - 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости курс лечения может быть продолжен до 6 мес или повторяться 2-3 раза в год.

Побочное действие:

Диагнозы

- Астигматизм
- Атрофия зрительного нерва
- Блефарит
- Глаукома

Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью* - при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Раствор не следует смешивать с другими лекарственными средствами. При необходимости одновременного применения др. глазных капель препарат закапывают последним, после полного всасывания предыдущего ЛС (не менее чем через 15 мин).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Viksipin>