

## Винилин



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливинокс](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ <b>Бальзам</b>	<b>1 фл.</b>
поливинокс	100 г
100 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.	
◇ <b>Бальзам</b>	<b>1 фл.</b>
поливинокс	50 г
50 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.	

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации. При приеме внутрь действует как обволакивающее, противовоспалительное и бактериостатическое средство.

### Показания к применению:

*Наружно*

- фурункулы;
- карбункулы;
- трофические язвы;
- гнойные раны;
- мастит;

- ранения мягких тканей;
- ожоги и обморожения.

**Внутрь**

- в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки,
- обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

**Относится к болезням:**

- [Карбункул](#)
- [Мастит](#)
- [Обморок](#)
- [Ожоги](#)
- [Раны](#)
- [Фурункул](#)

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- заболевания печени, желчного пузыря и почек;
- детский возраст;
- беременность;
- период лактации.

**Способ применения и дозы:**

Наружно (для смачивания салфеток и непосредственно нанесения на раневую поверхность) в достаточном количестве.

Внутрь: 1 раз в день через 5-6 ч после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 ч и прием препарата в 23-24 ч); при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке, курс – 16-20 дней; при гастритах с повышенной секреторной функцией и выраженной изжоге – в первый день – 1 чайную ложку, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – в течение 10-12 дней.

**Передозировка:**

Данные о случае передозировке отсутствуют.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Запрещено принимать препарат во время беременности и в период лактации.

**Особые указания и меры предосторожности:*****При нарушениях функции почек***

Запрещено принимать препарат при нарушениях функции почек.

***При нарушениях функции печени***

Запрещено принимать препарат при нарушениях функции печени.

**Винилин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vinilin>