Винилин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливинокс

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Бальзам***	**1 фл.**
поливинокс	100 г

100 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

◊ ***Бальзам***	**1 фл.**
поливинокс	50 г

50 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации. При приеме внутрь действует как обволакивающее, противовоспалительное и бактериостатическое средство.

Показания к применению:

Наружно

— фурункулы;

— карбункулы;

— трофические язвы;

— гнойные раны;

— мастит;

— ранения мягких тканей;

— ожоги и обморожения.

Внутрь

— в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки,

— обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

Относится к болезням:

- Карбункул
- Мастит
- Обморок
- Ожоги
- Раны
- Фурункул

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— заболевания печени, желчного пузыря и почек;

— детский возраст;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно (для смачивания салфеток и непосредственно нанесения на раневую поверхность) в достаточном количестве.

Внутрь: 1 раз в день через 5-6 ч после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 ч и прием препарата в 23-24 ч); при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке, курс – 16-20 дней; при гастритах с повышенной секреторной функцией и выраженной изжоге – в первый день – 1 чайную ложку, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – в течение 10-12 дней.

Передозировка:

Данные о случае передозировке отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Запрещено принимать препарат во время беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Запрещено принимать препарат при нарушениях функции почек.

При нарушениях функции печени

Запрещено принимать препарат при нарушениях функции печени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vinilin