

[Винилин \(Шостаковского Бальзам\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство, улучшающее регенерацию тканей с противовоспалительным эффектом. Оказывает также противомикробное, местное противовоспалительное и обволакивающее действие.

При наружном применении способствует очищению ран, эпителизации, регенерации тканей.

Показания к применению:

Для наружного применения: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, маститы, ранения мягких тканей, ожоги, отморожения, воспалительные заболевания кожи.

Для приема внутрь: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит.

Относится к болезням:

- [Карбункул](#)
- [Колит](#)
- [Мастит](#)
- [Ожоги](#)
- [Раны](#)
- [Фурункул](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к поливиноксу.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно, смачивая салфетки или нанося непосредственно на раневую поверхность.

Винилин (Шостаковского Бальзам)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При приеме внутрь разовая доза - 1.4 г, частота приема - 3-5 раз/сут.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно наружное применение, прием внутрь не рекомендуется.

Особые указания и меры предосторожности:

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно наружное применение, прием внутрь не рекомендуется.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vinilin_Shostakovskogo_Balzam