

Випросал В



Код АТХ:

- [M02AX10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Камфора](#)
- [Салициловая кислота](#)
- [Скипидар живичный](#)
- [Яд гадюки](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры или скипидара.

	1 г
яд гадюки обыкновенной	0.05 МЕД
салициловая кислота	10 мг
камфора	30 мг
скипидар живичный	30 мг

Вспомогательные вещества: эмульсионная основа (парафины твердые, вазелин медицинский, глицерин дистиллированный, эмульгатор, натрия хлорид, вода очищенная).

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Состав:

1 г мази содержит:

Випросал В

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

действующие вещества: 0,05 МЕД (мышинных единиц действия) яда гадюки обыкновенной сухого, 30 мг камфоры рацемической, 30 мг скипидара живичного и 10 мг салициловой кислоты;
вспомогательные вещества: вазелин, цетостеариловый спирт, парафин твердый, натрия цетилстеарилсульфат, глицерол, натрия хлорид и вода очищенная.

Описание:

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры и скипидара.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для наружного применения. Оказывает местное раздражающее и анальгезирующее действие. Вызывает раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Випросал В не предоставлены.

Показания к применению:

- болевой синдром при артритах различной этиологии;
- миалгии;
- невралгии;
- ишиас;
- радикулит.

Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)
- [Ишиас](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Радикулит](#)

Противопоказания:

- кожные заболевания (в том числе аллергические и гнойные);
- активный туберкулез легких;
- лихорадочные состояния;
- общее истощение;
- выраженная недостаточность мозгового и коронарного кровообращения;
- склонность к ангиоспазмам;
- тяжелые нарушения функции печени;
- тяжелые нарушения функции почек;

Випросал В

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно.

Мазь наносят на кожу болезненных участков 1 раз/сут в дозе от 5-10 г (1-2 чайные ложки) по частям и втирают в кожу, при сильных болях - 2 раза/сут до исчезновения болевого синдрома.

Курс лечения в среднем составляет 10 дней.

После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать попадания мази в глаза и другие слизистые оболочки.

Побочное действие:

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек или крапивница. Во избежание побочных явлений рекомендуем предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату. При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Випросал В не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Випросал В не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу. При случайном попадании на слизистые оболочки мазь вызывает сильное раздражение. После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. При попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой. Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу.

Использование в педиатрии

Необходимость применения препарата у детей определяется индивидуально.

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек.

При нарушениях функции печени

Препарат противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не хранить в холодильнике и морозильной камере. Хранить в недоступном

Випросал В

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Viprosal_V