Виру-Мерц Серол



Код АТХ:

- D06BB02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тромантадин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения 1%*** прозрачный, бесцветный.

	1 г
тромантадина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, сорбитол 70% раствор, метилпарагидроксибензоат, сорбиновая кислота, гидроксиэтилцеллюлоза, вода очищенная.

5 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусный препарат для наружного применения. *Активен в отношении* вирусов Herpes simplex типов 1 и 2, Varicella zoster. Ингибирует абсорбцию и проникновение вирусов внутрь клетки. Резистентности вирусов к препарату не развивается. Снимает характерные для проявления герпетической инфекции боль, жжение и зуд, сокращает длительность течения заболевания, удлиняет периоды ремиссии.

Фармакокинетика

При наружном применении всасывание минимальное, не определяется в крови и моче.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания кожных покровов, вызванные вирусом Herpes simplex типа 1 (герпес губ, носа, лицевого нерва) и типа 2 (генитальный герпес);

— воспалительные заболевания кожных покровов, вызванные вирусом Varicella zoster.

Относится к болезням:

- Герпес

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к тромантадину и парабенам.

Способ применения и дозы:

Гель наносят на пораженные участки кожи 3-5 раз/сут (при необходимости чаще), слегка втирая. Курс лечения - 5 дней. Лечение препаратом необходимо прекратить и обратиться к врачу, если через 2 дня после применения препарата не наблюдается клинического улучшения.

Побочное действие:

Возможен контактный дерматит.

Передозировка:

Данные о передозировке не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Виру-Мерц Серол не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Эффективность лечения будет тем выше, чем раньше оно начато (при первых симптомах инфекции). Применение в течение первых 2-3 ч от начала заболевания предотвращает дальнейшее развитие инфекции.

Не предупреждает передачу вируса герпеса половым путем, поэтому в период лечения следует воздерживаться от половых контактов, даже при отсутствии клинических проявлений.

Гель не следует наносить в области глаз.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Viru-Merc_Serol