

[Вита-Иодурол](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли глазные** в виде прозрачного, бесцветного раствора.

	1 мл
кальция хлорид	2 мг
магния хлорид	3 мг
никотиновая кислота	300 мкг
аденозин	1 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, бензалкония хлорид, натрия гидроксид, вода д/и.

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для лечения катаракты. Улучшает трофику хрусталика, обмен веществ и кровоснабжение глазного яблока. Компоненты, входящие в состав препарата, способствуют улучшению метаболизма хрусталика, препятствуют отложению протеина в тканях хрусталика, положительно воздействуют на периорбитальную циркуляцию.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Вита-Иодурол не предоставлены.

Показания к применению:

Профилактика и лечение катаракты, в т.ч.:

- старческой;
- травматической;
- врожденной;
- вторичной.

Относится к болезням:

- [Катаракта](#)
- [Травмы](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Вита-Иодурол не применяют у детей.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют местно. Глазные капли закапывают в конъюнктивальный мешок пораженного глаза по 1-2 капли 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно развитие местных аллергических реакций.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Вита-Иодурол отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период лактации нет.

Возможно применение препарата у беременных женщин и кормящих матерей в том случае, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействия препарата Вита-Иодурол с другими лекарственными средствами в настоящее время не известны.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат применяют только местно. Нельзя принимать внутрь или вводить в виде инъекций.

При одновременном применении других глазных капель следует делать перерыв в 15 мин между инстилляциями.

В период лечения препаратом Вита-Иодурол не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При использовании жестких линз следует снять их перед закапыванием и вновь надеть через 15-20 мин после инстилляций препарата.

Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком пипетки к глазу.

Использование в педиатрии

Достаточного опыта по применению препарата у детей нет.

Применение в детском возрасте

Вита-Иодурол не применяют у детей.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Вита-Иодурол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 мес.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vita-IoduroI>