

## Витабакт



### Код АТХ:

- [S01AX16](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пиклоксидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли глазные 0.05%** прозрачные, бесцветные или слегка желтоватого цвета.

	<b>1 мл</b>
пиклоксидина дигидрохлорид	500 мкг,
что соответствует содержанию пиклоксидина	434 мкг

*Вспомогательные вещества:* декстроза (глюкоза) безводная, полисорбат 80, вода очищенная.

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат с противомикробным действием, производное бигуанидов.

## Витабакт

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Активен в отношении *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Eberthella typhosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Shigella dysenteriae*, *Bacillus subtilis*, *Chlamydia trachomatis*; некоторых вирусов и грибов.

### Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция пиклоксидина низкая.

### Показания к применению:

Взрослые и дети от 0 лет:

— бактериальные инфекции переднего отдела глаза;

— дакриоцистит;

— профилактика инфекционных осложнений в послеоперационном периоде после хирургических вмешательств в области переднего отдела глаза.

### Относится к болезням:

- [Дакриоцистит](#)
- [Инфекции](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

При лечении бактериальных инфекций препарат закапывают по 1 капле в каждый глаз 2-6 раз/сут. Продолжительность лечения - 10 дней, целесообразность и необходимость увеличения срока лечения больше 10 дней должна определяться врачом.

В послеоперационном периоде препарат закапывают по 1 капле в каждый глаз 3-4 раза/сут. Витабакт также может использоваться в рамках предоперационной подготовки (для профилактики послеоперационных осложнений) по 1-2 капли непосредственно перед хирургическим вмешательством.

### Правила использования препарата

Глазные капли Витабакт выпускаются в герметичном полиэтиленовом флаконе с капельницей, для их закапывания не требуется пипетки. Для открытия флакона необходимо завинтить до упора крышку, при этом шип на ее внутренней стороне должен проколоть капельницу.

Для закапывания глазных капель необходимо голову больного запрокинуть немного назад, взор пациента должен быть направлен вверх. Препарат закапывают в нижний конъюнктивальный мешок, осторожно оттянув нижнее веко.

Для предотвращения загрязнения раствора препарата при закапывании пациентам следует избегать контакта кончика капельницы с глазом и кожей.

### Побочное действие:

Редко: аллергические реакции в виде конъюнктивальной гиперемии.

### Передозировка:

Данные о передозировке препарата Витабакт отсутствуют.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

## **Витабакт**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Поскольку применение препарата при беременности и в период лактации не изучалось, Витабакт не рекомендуется назначать беременным и кормящим женщинам.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Взаимодействие препарата Витабакт с другими лекарственными средствами в настоящее время не известно.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При совместном применении с другими офтальмологическими препаратами перерыв между закапываниями должен быть не менее 15 мин.

Витабакт не окрашивает контактные линзы, включая мягкие гидрофильные, однако при инфекционных заболеваниях глаз ношение контактных линз противопоказано.

Нельзя использовать глазные капли Витабакт для субконъюнктивальных инъекций или вводить в переднюю камеру глаза.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При снижении четкости зрения на фоне лечения Витабактом пациентам следует отказаться от управления автотранспортом и работы с механизмами.

### **Условия хранения:**

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vitabakt>