Витагамма

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пиридоксин
- Тиамин
- Цианокобаламин
- Лидокаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] [мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения	**1 мл**	**1 амп.**
лидокаина гидрохлорид	10 мг	20 мг
пиридоксина гидрохлорид	50 мг	100 мг
тиамина гидрохлорид	50 мг	100 мг
цианокобаламин	500 мкг	1 мг

2 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие определяется свойствами, входящих в состав препарата компонентов. Витамины B_1, B_6 и B_{12} регулируют белковый, углеводный и жировой обмен, способствуют его нормализации, улучшают функцию двигательных, чувствительных и вегетативных нервов.

Тиамин (B_1) препятствует гликолизированию белка, обладает антиоксидантной активностью, участвует в регуляции проведение нервных импульсов.

Пиридоксин (B_6) участвует в синтезе нейромедиаторов (дофамин, норадреналин и др.), реакциях декарбоксилирования, дез- и переаминирования аминокислот, препятствует накоплению аммиака и ускоряет регенеративные процессы в нервной ткани.

Цианокобаламин (B_{12}) необходим для нормального гемопоэза, участвует в синтезе миелиновой ткани.

Показания к применению:

— неврологические заболевания, обусловленные доказанным дефицитом витаминов B_1, B_6 и B_{12};

— в качестве вспомогательного средства для симптоматической терапии заболеваний нервной системы различного

происхождения: невриты и полиневриты (в т.ч. сопровождающиеся болевым синдромом), в т.ч. ретробульбарный неврит, периферические парезы (в т.ч. лицевого нерва), невралгии, полинейропатии (диабетическая, алкогольная и др.)

Относится к болезням:

- Болевой синдром
- Невралгия
- Неврит
- Неврозы
- Полинейропатия

Противопоказания:

— беременность и период грудного вскармливания;

— тромбозы и тромбоэмболии;

— тяжелые формы декомпенсированной сердечной недостаточности;

— эритремия;

— эритроцитоз;

— тяжелые кровотечения;

— артериальная гипотензия;

— шоковые состояния;

— детский возраст;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: энцефалопатия Вернике, предклимактерический и климактерический период у женщин, тяжелая стенокардия, доброкачественные и злокачественные новообразования, сопровождающиеся мегалобластной анемией и дефицитом витамина B_{12}, склонность к образованию тромбов, пожилой возраст (старше 65 лет).

Способ применения и дозы:

Глубоко внутримышечно, в тяжелых случаях и при острых болях вводят ежедневно по 2 мл. После того, как пройдет обострение или при легких формах заболевания вводят 2-3 раза в неделю по 2 мл.

Побочное действие:

В отдельных случаях может возникнуть повышенное потоотделение, тахикардия, угревая сыпь. Описаны случаи развития кожных аллергических реакций (зуд, крапивница и другие виды кожной сыпи), а также системных реакций (затрудненное дыхание, отек Квинке, анафилактический шок).

В случае очень быстрого введения препарата могут возникнуть: головокружение, головная боль, рвота, тахикардия или брадикардия, аритмия, судороги, возбуждение, кардиалгия.

Передозировка:

При передозировке происходит усиление симптомов побочного действия препарата, проводится симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Тиамин разрушается в растворах, содержащих сульфиты.

Терапевтические дозы витамина B_6 снижают эффект леводопы. Йоны меди, значения pH более 3 ускоряют распад тиамина.

Витамин B_{12} несовместим с солями тяжелых металлов. В растворах, содержащих тиамин, цианокобаламин (как и другие витамины группы В) быстро разрушается (низкие концентрации ионов железа, присутствующих в препарате, могут это предотвратить).

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью: пожилой возраст (старше 65 лет).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям.

Условия хранения:

В защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 15°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitagamma