

Виталипид Н детский



Код АТХ:

- [A11BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины \[парентеральное введение\]](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Эмульсия для инфузий белого цвета, гомогенная.

	1 мл
ретинола пальмитат	135.3 мкг,
что соответствует содержанию ретинола (вит. А)	69 мкг
α-токоферол (вит. Е)	640 мкг
эргокальциферол (вит. D ₂)	1 мкг
фитоменадион (вит. К ₁)	20 мкг

Вспомогательные вещества: масло соевых бобов - 100 мг, фосфолипиды яичного желтка - 12 мг, глицерол безводный - 22 мг, натрия гидроксид 1М - до рН 8.0 (является корректором рН и на этикетки ампулы и картонные пачки не выносятся), вода д/и - до 1 мл.

10 мл - ампулы стеклянные (10) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитаминовый препарат.

Фармакологические свойства препарата обусловлены свойствами входящих в его состав жирорастворимых витаминов. Виталипид Н детский - это смесь витаминов в количествах, потребляемых при обычной диете, и не должна иметь никаких фармакодинамических эффектов кроме восстановления и поддержания нормального уровня витаминов А, D₂, Е, К₁.

Показания к применению:

— для обеспечения суточной потребности в жирорастворимых витаминах А, D₂, Е, К₁ при парентеральном питании у новорожденных и детей до 11 лет.

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— заболевания, протекающие с нарушением обмена жиров, такие, как почечная недостаточность, декомпенсированный сахарный диабет, панкреатит, нарушение функции печени, гипотиреоз (если отмечается гипертриглицеридемия) и тяжелый сепсис. У таких больных в случае использования Виталипида необходимо тщательно контролировать уровень триглицеридов в сыворотке крови;

— повышенная чувствительность к протеинам сои и яиц.

Способ применения и дозы:

Внутривенно.

Перед использованием Виталипид Н детский необходимо развести. Все манипуляции должны проводиться в асептических условиях.

Для **новорожденных с массой тела менее 2.5 кг** (недоношенных или детей с низкой массой тела при рождении) суточная доза составляет 4 мл/кг массы тела Виталипида Н детский в сутки.

Для **остальных детей в возрасте до 11 лет** препарат назначают в дозе 10 мл (1 ампула) в сутки.

За 1 час до начала инфузии в асептических условиях 10 мл (одну ампулу) препарата Виталипид Н детский добавляют к 500 мл Интралипида 10% и 20%. Полученный раствор перемешивают легким покачиванием, затем используют для парентеральных инфузий в соответствии с инструкцией по применению Интралипида. Полученный раствор необходимо использовать в течение 24 часов.

Побочное действие:

На фоне инфузии Виталипида Н детский могут возникать побочные реакции, характерные для любых жировых эмульсий для парентерального питания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Виталипид Н детский содержит витамин К₁, который может взаимодействовать с антикоагулянтами кумаринового ряда.

Особые указания и меры предосторожности:

Виталипид Н детский может быть использован только разведенным.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при заболеваниях, протекающих с нарушением обмена жиров, таких, как почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях, протекающих с нарушением обмена жиров, таких, как нарушение функции печени.

Применение в детском возрасте

Применяют у новорожденных и детей до 11 лет.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitalipid_N_detskiy