Витамин Е (Альфа-Токоферола Ацетат)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Капсулы*** красного цвета, шарообразные; содержимое капсул - маслянистая жидкость от светло-желтого цвета до темно-желтого цвета, без прогорклого запаха.

	1 капс.
витамин Е (токоферола ацетат)	100 мг

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное - 100 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин - 44.73 мг, глицерол - 14.67 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.29 мг, краситель азорубин - 0.31 мг.

10 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (6) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (50) - коробки картонные (для стационаров).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (100) - коробки картонные (для стационаров).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (200) - коробки картонные (для стационаров).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (400) - коробки картонные (для стационаров).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (600) - коробки картонные (для стационаров).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (1000) - коробки картонные (для стационаров).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (2000) - коробки картонные (для стационаров).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (4000) - коробки картонные (для стационаров).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (6000) - коробки картонные (для стационаров).

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Витамин Е. Оказывает антиоксидантное действие, участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, тканевом дыхании, других важнейших процессах тканевого метаболизма, предупреждает гемолиз эритроцитов, препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров.

Фармакокинетика

При приеме внутрь абсорбция составляет 50%; в процессе всасывания образует комплекс с липопротеидами (внутриклеточные переносчики токоферола). Для абсорбции необходимо наличие желчных кислот. Связывается с альфа

1- и бета-липопротеидами, частично - с сывороточным альбумином. При нарушении обмена белков транспорт затрудняется. C_{max} достигается через 4 ч. Депонируется в надпочечниках, гипофизе, семенниках, жировой и мышечной ткани, эритроцитах, печени. Более 90% выводится с желчью, 6% - почками.

Показания к применению:

Гиповитаминоз, состояния реконвалесценции после заболеваний, протекавших с лихорадочным синдромом, высокие физические нагрузки, пожилой возраст, заболевания связочного аппарата и мышц. Климактерические вегетативные нарушения. Неврастения при переутомлении, астенический неврастенический синдром, первичная мышечная дистрофия, посттравматическая, постинфекционная вторичная миопатия. Дегенеративные и пролиферативные изменения суставов и связочного аппарата позвоночника и крупных суставов.

Относится к болезням:

- Астения
- Лихорадка
- Миопия
- Неврит
- Реконвалесценция

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к токоферолу.

Способ применения и дозы:

Обычно назначают по 100-300 мг/сут. При необходимости дозу можно увеличить до 1 г/сут.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции; при приеме в высоких дозах - диарея, боли в эпигастрии; при в/м введении - болезненность, инфильтрат в месте введения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Токоферол применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Аднексит
- Апоплексия яичника
- Атрофический вагинит
- Бактериальный вагиноз

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять при тяжелом кардиосклерозе, инфаркте миокарда, при повышенном риске развития тромбоэмболий.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitamin_E_Alfa-Tokoferola_Acetat