Витамин Е Зентива



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Капсулы*** красного цвета, овальные; содержимое капсул - прозрачное масло светло-желтого цвета.

	1 капс.
токоферола ацетат	100 мг

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное - 7.5 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин - 49.38 мг, глицерол 85% - 27.46 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.049 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] (Е124) - 0.22 мг, вода очищенная - 32.898 мг.

30 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

◊ ***Капсулы*** красного цвета, овальные; содержимое капсул - прозрачное масло светло-желтого цвета.

	1 капс.
токоферола ацетат	200 мг

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное - 15 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин - 71.824 мг, глицерол 85% - 39.934 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.072 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] (Е124) - 0.319 мг, вода очищенная - 47.851 мг.

30 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

◊ ***Капсулы*** красного цвета, овальные; содержимое капсул - прозрачное масло светло-желтого цвета.

	1 капс.
токоферола ацетат	400 мг

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное - 30 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин - 112.225 мг, глицерол 85% - 62.397 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.112 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] (Е124) - 0.499 мг, вода очищенная - 74.768 мг.

20 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
30 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гиповитаминоза витамина Е, в т.ч.:

— при дегенеративных и пролиферативных изменениях костно-мышечной системы, в частности при мышечной дистрофии;

— при боковом амиотрофическом склерозе (в составе комплексной терапии);

— при хроническом гепатите (в составе комплексной терапии);

— в состоянии реконвалесценции после тяжелых заболеваний, травм, операций;

— при тяжелых физических нагрузках;

— при нарушениях менструального цикла (в составе комплексной терапии при гормональном лечении нарушений менструального цикла).

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Нарушения менструального цикла
- Реконвалесценция
- Склерит
- Травмы

Противопоказания:

— острый инфаркт миокарда;

— детский возраст;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применяют у больных тяжелым кардиосклерозом, перенесенным инфарктом миокарда, при повышенном риске развития тромбоэмболии; гипопротромбинемия, вызванная недостаточностью витамина К, может ухудшиться при применении витамина Е в дозе более 400 МЕ (1 мг=1.21 МЕ).

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для взрослых.

Лечение гиповитаминоза витамина Е: назначают по 100 мг (1 капс.) 1 раз/сут до устранения симптомов гиповитаминоза.

Гиповитаминоз Е, сопровождающийся дегенеративными и пролиферативными изменениями скелетно-мышечной системы, в частности мышечной дистрофией, боковым амиотрофическим склерозом (в составе комплексной терапии): назначают по 100 мг (1 капс.) 1 раз/сут в течение 1-2 месяцев.

Гиповитаминоз Е, сопровождающийся хроническим гепатитом (в составе комплексной терапии): 100 мг (1 капс.) 1 раз/сут.

Гиповитаминоз Е при состояниях реконвалесценции после тяжелых заболеваний, травм, операций: 100 мг (1 капс.) 1 раз/сут в течение 1-2 недель.

Гиповитаминоз Е при повышенных физических нагрузках: 100 мг (1 капс.) 1 раз/сут во время повышенных физических нагрузок.

Гиповитаминоз Е, сопровождающийся нарушениями менструального цикла (в составе комплексной терапии при гормональном лечении нарушений менструального цикла): по 300-400 мг через день последовательно, начиная с 17 дня цикла до последнего дня цикла (день перед первым днем менструации).

Побочное действие:

Как правило, при применении в рекомендованных дозах побочные эффекты не наблюдаются.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, гастралгия.

Со стороны обмена веществ и питания: гиперкреатининурия, повышение активности КФК, повышение концентрации

холестерина в сыворотке крови.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии.

Передозировка:

Симптомы: высокие дозы витамина Е (400-800 мг/сут в течение длительного времени) могут вызывать нарушения зрения, диарею, головокружение, головную боль, тошноту, сильную утомляемость, обморок, рост белых волос на участках алопеции при буллезном эпидермолизе.

Очень высокие дозы (превышающие 800 мг в течение длительного времени) могут вызывать кровотечение у пациентов с недостаточностью витамина К; они могут нарушить метаболизм гормонов щитовидной железы и увеличить риск тромбофлебитов и тромбоэмболии у чувствительных пациентов.

Лечение: проведение симптоматической терапии, отмена препарата, назначение ГКС.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания прием препарата только по рекомендации врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает эффект ГКС, НПВС, сердечных гликозидов.

Повышает эффективность противоэпилептических средств у больных эпилепсией (у которых повышено содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов).

Высокие дозы железа усиливают окислительные процессы в организме, что повышает потребность в витамине Е.

Витамин Е усиливает действие антикоагулянтов, если дозы превышают 400 МЕ/сут. Одновременное применение витамина Е в дозе более 400 МЕ/сут с антикоагулянтами (производными кумарина и индандиона) повышает риск развития гипотромбинемии и кровотечений.

Назначение витамина Е в высоких дозах может вызвать дефицит витамина А в организме.

Колестирамин, колестипол, минеральные масла снижают всасывание витамина Е.

Особые указания и меры предосторожности:

При врожденном буллезном эпидермолизе в местах, пораженных алопецией, могут начать расти белые волосы.

Недостаток витамина К в организме, вызывающий гипопротромбинемию, может увеличиваться при применении витамина Е в высоких дозах (более 400 МЕ/сут). Витамин Е усиливает действие антикоагулянтов, если дозы превышают 400 МЕ/сут.

Во избежание его передозировки не рекомендуется одновременный прием других витаминных комплексов, содержащих витамин Е.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Прием препарата Витамина Е Зентива не влияет на способность управлять транспортными средствами или механизмами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitamin_E_Zentiva_0