

[Витапрост](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Простаты экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** от голубого до светло-синего цвета, двояковыпуклые, допустимы вкрапления.

	1 таб.
экстракт простаты	100 мг,
в пересчете на водорастворимые пептиды	20 мг

Вспомогательные вещества: сахароза - 28.5 мг, лактозы моногидрат - 7.125 мг, кальция стеарата моногидрат - 2.5 мг, кросповидон - 9.275 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 102.6 мг.

Состав оболочки: акрил-из (сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1), титана диоксид, тальк, триэтилцитрат, кремния оксид коллоидный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат, индигокармин) - 25 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные

◇ **Суппозитории ректальные** от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

	1 супп.
экстракт простаты (субстанция "Сампрост", в пересчете на 20% содержание растворимых пептидов)	50 мг

Вспомогательные вещества: жир твердый (витепсол, суппосир).

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Витапрост обладает органотропным действием в отношении предстательной железы. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, улучшает микроциркуляцию в предстательной железе, обладает антиагрегантной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

На основании *данных клинических исследований* доказано, что Витапрост умеренно уменьшает объем предстательной железы. Препарат уменьшает выраженность обструкции и ирритативной симптоматики при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что выражается в увеличении максимальной и средней объемных скоростей потока мочи и уменьшении объема остаточной мочи.

Данные клинических исследований доказали, что применение препарата Витапрост уменьшает вероятность развития обострения хронического антибактериального простатита, не вызывает изменений показателей клинического и биохимического анализа крови, общего анализа мочи. Эффективность применения препарата Витапрост для профилактики обострений хронического абактериального простатита по оценке врачей-исследователей составляет 97.5%.

Витапрост нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, вызванные простатитом, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Витапрост не предоставлены.

Показания к применению:

- хронический простатит;
- профилактика обострений хронического абактериального простатита (для таблеток);
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы (для таблеток);
- состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки следует принимать внутрь по 1 таб. 2 раза/сут. Продолжительность курса лечения при *доброкачественной гиперплазии предстательной железы* составляет не менее 30 дней; при *хроническом простатите* - не менее 10 дней.

Для *профилактики обострений хронического простатита* применяют по 1 таб. 2 раза/сут в течение не менее 30 дней - 1-2 раза/год.

Ректальные суппозитории применять следует после самопроизвольного опорожнения или очистительной клизмы кишечника по 1 суп. 1 раз/сут. После введения суппозитория пациенту следует находиться в постели в течение 30-40 мин.

Продолжительность курса лечения суппозиториями Витапрост составляет не менее 10 дней. .

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны - при применении суппозиториях Витапрост; очень редко - при применении таблеток Витапрост.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат у женщин не применяется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Проведенные дополнительные клинические исследования, направленные на оценку степени уменьшения болевого синдрома в результате лечения хронического простатита препаратом Витапрост, позволили установить эффективность препарата при лечении хронического абактериального простатита, прежде всего для уменьшения болевого синдрома.

Препарат Витапрост суппозитории ректальные может быть рекомендован также в качестве одного из компонентов комплексной терапии хронического простатита у пациентов всех возрастных групп (в т.ч. при сочетании с доброкачественной гиперплазией предстательной железы), а также для реабилитации пациентов после перенесенного острого простатита.

Лечение хронического простатита, состояний до и после оперативных вмешательств на предстательной железе должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением таблеток Витапрост применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

Проведенные клинические исследования, направленные на оценку влияния препарата Витапрост на сперматогенез у пациентов с бесплодием, развившемся на фоне хронического простатита, позволили установить положительное влияние препарата на сперматогенез. Витапрост может быть рекомендован пациентам с секреторно-токсической формой бесплодия, развившейся на фоне хронического простатита.

Применение в пожилом возрасте

Препарат Витапрост суппозитории ректальные может быть рекомендован также в качестве одного из компонентов комплексной терапии хронического простатита у пациентов всех возрастных групп (в т.ч. при сочетании с доброкачественной гиперплазией предстательной железы), а также для реабилитации пациентов после перенесенного острого простатита.

Условия хранения:

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Суппозитории ректальные следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Витапрост

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vitaprost>