

Витапрост Форте



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суппозитории ректальные** белого с желтоватым, кремового или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы; допускается появление белого налета на поверхности.

	1 супп.
экстракт простаты	100 мг,
в пересчете на водорастворимые пептиды	20 мг

Вспомогательные вещества: жир твердый (витепсол, марки H15, W35, суппосир, марки NA15, NAS50) - достаточное количество для получения суппозитория массой 1.25 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат животного происхождения. Витапрост форте обладает органотропным действием в отношении предстательной железы. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

На основании данных клинических исследований доказано, что Витапрост форте умеренно уменьшает объем предстательной железы. Препарат уменьшает выраженность обструктивной и ирритативной симптоматики при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что выражается в увеличении максимальной и средней объемных скоростей потока мочи и уменьшении объема остаточной мочи.

Витапрост форте улучшает микроциркуляцию крови в стенке мочевого пузыря за счет расширения неповрежденных сосудов (эффект вазодилатации), этим способствует восстановлению доставки кислорода в ткани, испытывающие гипоксию, что стимулирует физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное действие за счет улучшения процессов трофики стенки мочевого пузыря и стимуляции регенераторных процессов. Активация органного кровотока способствует улучшению адаптационной и сократительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого пузыря.

Уменьшением ишемии детрузора можно объяснить выраженное снижение гиперактивности мочевого пузыря, которое продолжается и после окончания применения Витапрост форте.

Витапрост форте способствует нормализации параметров предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Витапрост форте не предоставлены.

Показания к применению:

- хронический простатит;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
- лечение ургентного (императивного) недержания мочи, ургентных (императивных) позывов к мочеиспусканию и учащенного мочеиспускания при неосложненных формах гиперактивности мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах;
- состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют ректально по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения или очистительной клизмы кишечника по 1 суп. 1 раз/сут. После введения суппозитория пациенту следует находиться в постели в течение 30-40 мин.

Продолжительность курса лечения врач определяет индивидуально. Минимальная продолжительность курса лечения суппозиториями Витапрост форте при *доброкачественной гиперплазии предстательной железы* - 15 дней, при *хроническом простатите* - 10 дней, при *гиперактивном мочевом пузыре* - 20 дней.

Побочное действие:

Очень редко: аллергические реакции.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не применяется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Витапрост Форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitaprost_Forte