

## [Витапрост Плюс](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ломефлоксацин](#)
- [Простаты экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Суппозитории ректальные** от белого или почти белого до светло-кремового с сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

	<b>1 супп.</b>
экстракт простаты	100 мг,
в пересчете на водорастворимые пептиды	20 мг
ломефлоксацина гидрохлорид	400 мг

*Вспомогательные вещества:* жир твердый (витепсол) - достаточное количество до получения суппозитория массой 2.25 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат с антибактериальным и противовоспалительным действием, применяемый при заболеваниях предстательной железы.

Ломефлоксацин - бактерицидное средство широкого спектра действия из группы фторхинолонов. Воздействует на бактериальный фермент ДНК-гиразу, обеспечивающую сверхспирализацию ДНК, образует комплекс с ее тетрамером (субъединицы гиразы A2B2) и нарушает транскрипцию и репликацию ДНК, приводит к гибели микробной клетки.

*Высоко активен в отношении грамотрицательных аэробных микроорганизмов:* *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Escherichia coli*, *Citrobacter diversus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter cloacae*, *Proteus vulgaris*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Moraxella morgani*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila*.

*Умеренно чувствительны к препарату Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Serratia liquifaciens*, *Serratia marcescens*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Chlamydia trachomatis*, *Hafnia alvei*, *Citrobacter freundii*, *Aeromonas hydrophila*, *Proteus mirabilis*, *Proteus stuartii*, *Providencia rettgeri*, *Providencia alcalifaciens*, *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella ozaenae*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter agglomerans*.

*Устойчивы к препарату Streptococcus spp., Pseudomonas cepacia, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Mycoplasma hominis и анаэробные бактерии.*

На большинство микроорганизмов ломефлоксацин действует в низких концентрациях (концентрация, необходимая для подавления роста 90% штаммов, обычно не более 1 мкг/мл). Резистентность развивается редко.

Экстракт простаты обладает органотропным действием на простату. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе. Нормализует параметры простаты и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, улучшает копулятивную функцию.

#### **Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата Витапрост Плюс не предоставлены.

### **Показания к применению:**

- острый и хронический бактериальный простатит, вызванный чувствительными микроорганизмами, (в т.ч. сопровождающийся воспалительными заболеваниями мочеполового тракта);
- состояния до и после оперативного вмешательства на предстательной железе.

### **Относится к болезням:**

- [Простатит](#)

### **Противопоказания:**

- детский и подростковый возраст до 18 лет (период формирования и роста скелета);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при церебральном атеросклерозе, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС с эпилептическим синдромом.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат следует применять ректально по 1 суппозиторию 1 раз/сут после клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника.

Перед применением суппозиторий следует извлечь из контурной ячейковой упаковки. После введения препарата пациенту следует в течение 30-40 мин находиться в постели.

Курс лечения продолжается до исчезновения возбудителя в секрете простаты и составляет от 10 до 30 дней (индивидуально для каждого пациента).

### **Побочное действие:**

Побочные действия препарата Витапрост Плюс, за исключением аллергических реакций, связаны с наличием в его составе антибиотика ломефлоксацин.

*Аллергические реакции:* кожный зуд, крапивница, фотосенсибилизация, злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона).

*Со стороны нервной системы:* астения, головокружение, нервозность, тревожность, утомляемость, недомогание, головная боль, обморочные состояния, бессонница, галлюцинации, судороги, гиперкинезы, тремор, парестезии, депрессия, возбуждение.

*Со стороны пищеварительной системы:* псевдомембранозный энтероколит, дисбактериоз, сухость слизистой оболочки полости рта, диарея или запор, метеоризм, изменение цвета языка, снижение аппетита или булимия, извращение вкуса, повышение активности печеночных трансаминаз.

*Со стороны органов кроветворения и системы гемостаза:* кровотечения из органов ЖКТ, тромбоцитопения, повышение фибринолиза, лимфоаденопатия, пурпура, носовое кровотечение.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* снижение АД, тахикардия, брадикардия, экстрасистолия, аритмии, прогрессирование сердечной недостаточности и стенокардии, тромбоэмболия легочной артерии, кардиомиопатия, флебит.

*Со стороны мочевыделительной системы:* гломерулонефрит, дизурия, полиурия, анурия, альбуминурия, уретральные кровотечения, кристаллурия, гематурия, задержка мочи, отеки.

*Со стороны половой системы:* орхит, эпидидимит.

*Со стороны обмена веществ:* гипогликемия, подагра.

*Со стороны костно-мышечной системы:* артралгия, васкулит, судороги икроножных мышц, боли в спине и груди.

*Со стороны дыхательной системы:* одышка, бронхоспазм, кашель, гиперсекреция мокроты, гриппоподобные симптомы.

*Со стороны органов чувств:* нарушение зрения, боль и шум в ушах, боль в глазах.

*Прочие:* усиление потоотделения, озноб, жажда, суперинфекция.

## **Передозировка:**

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат не применяется у женщин.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении повышается активность пероральных антикоагулянтов и увеличивается токсичность НПВС.

Лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение препарата.

Отсутствует перекрестная устойчивость с пенициллинами, цефалоспоридами, аминогликозидами, ко-тримоксазолом, метронидазолом.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В период лечения препаратом Витапрост Плюс следует ограничить одновременное применение противомикробных средств - фторхинолонов во избежание развития передозировки и увеличения частоты побочных эффектов.

При циррозе печени не требуется коррекции режима дозирования (при условии нормальной функции почек).

В период лечения следует избегать длительного воздействия солнечного света и использования искусственного УФ освещения. При первых признаках фотосенсибилизации (в т.ч. повышение чувствительности кожи, ожог, гиперемия, отек, появление волдырей, сыпи, зуда, дерматита), гиперчувствительности, проявлениях нейротоксичности (в т.ч. возбуждение, судороги, тремор, светобоязнь, спутанность сознания, токсические психозы, галлюцинации) терапию следует прекратить.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения пациентам необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **При нарушениях функции печени**

При циррозе печени не требуется коррекции режима дозирования (при условии нормальной функции почек).

### **Применение в детском возрасте**

---

## **Витапрост Плюс**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Противопоказание: детский и подростковый возраст до 18 лет (период формирования и роста скелета).

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Vitaprost\\_Plyus](http://drugs.thead.ru/Vitaprost_Plyus)