Витапрост форте (свечи)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Простаты экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Витапрост®

Суппозитории ректальные, 50 (10) мг. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ или пленки ПВХ ламинированной ПЭ 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 (20) мг. В контурной ячейковой упаковке 10 шт. 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке.

Витапрост® форте

Суппозитории ректальные, 100 (20) мг. В контурной ячейковой упаковке 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке картонной.

Состав:

Витапрост®

Суппозитории ректальные	1 супп.
активное вещество:	
простаты экстракт («Сампрост» субстанция)	50 мг
(в пересчете на в пересчете на водорастворимые	

пептиды — 10 мг)	
вспомогательное вещество: жир твердый (Витепсол, марки H 15, W35, Суппосир, марки NA 15, NAS 50) — достаточное количество для получения суппозитория массой 1,25 г	

Витапрост®

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	1 табл.
активное вещество:	
простаты экстракт	100 мг
(в пересчете на водорастворимые пептиды — 20 мг)	
вспомогательные вещества: сахароза — 28,5 мг; лактозы моногидрат — 7,125 мг; кальция стеарата моногидрат — 2,5 мг; кросповидон — 9,275 мг; МКЦ — до 102,6 мг	
оболочка: акрил-из (метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер 1:1, титана диоксид, тальк, триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат, индигокармин) — 25 мг	

Витапрост® форте

Суппозитории ректальные	1 супп.
активное вещество:	
простаты экстракт	100 мг
(в пересчете на водорастворимые пептиды — 20 мг)	
вспомогательное вещество: жир твердый (витепсол марки H15, W35; суппосир марки NA15, NAS50) — достаточное количество до получения суппозитория массой 1,25 г	

Описание:

Витапрост®

Суппозитории: от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

Таблетки: покрытые кишечнорастворимой оболочкой, от голубого до светло-синего цвета, круглые, двояковыпуклые, допускается наличие вкраплений.

Витапрост® форте

Суппозитории: белого с желтоватым, кремоватым или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, простатотропное.

Фармакодинамика

Витапрост®

Витапрост® форте

Обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию. Витапрост® и Витапрост® форте нормализуют параметры предстательной железы и эякулята.

На основании данных клинических исследований доказано, что Витапрост® таблетки и Витапрост® форте умеренно уменьшают объем предстательной железы. Препараты уменьшают выраженность обструктивной и ирритативной симптоматики при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что выражается в увеличении максимальной и средней объемных скоростей потока мочи и уменьшении объема остаточной мочи.

Данные клинических исследований доказали, что применение препарата Витапрост® уменьшает вероятность развития обострений хронического абактериального простатита, не вызывает изменений показателей клинического и биохимического анализа крови, общего анализа мочи. Эффективность применения препарата Витапрост® для профилактики обострений хронического абактериального простатита по оценкам врачей-исследователей составляет 97,5%.

Витапрост® форте улучшает микроциркуляцию крови в стенке мочевого пузыря за счет расширения неповрежденных сосудов (эффект вазодилатации), этим способствует восстановлению доставки кислорода в ткани, испытывающие гипоксию, что стимулирует физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное действие за счет улучшения процессов трофики стенки мочевого пузыря и стимуляции регенераторных процессов. Активация органного кровотока способствует улучшению адаптационной и сократительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого пузыря.

Снижением ишемии детрузора можно объяснить выраженное снижение гиперактивности мочевого пузыря, которое продолжается и после окончания применения Витапрост® форте.

Показания к применению:

— хронический простатит;

— доброкачественная гиперплазия предстательной железы;

— лечение ургентного (императивного) недержания мочи, ургентных (императивных) позывов к мочеиспусканию и учащенного мочеиспускания при неосложненных формах гиперактивности мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах;

— состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы
- Простатит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют ректально по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения или очистительной клизмы кишечника по 1 суп. 1 раз/сут. После введения суппозитория пациенту следует находиться в постели в течение 30-40 мин.

Продолжительность курса лечения врач определяет индивидуально. Минимальная продолжительность курса лечения суппозиториями Витапрост форте при *доброкачественной гиперплазии предстательной железы* - 15 дней, при *хроническом простатите* - 10 дней, при *гиперактивном мочевом пузыре* - 20 дней.

Побочное действие:

Очень редко: аллергические реакции.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не применяется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitaprost_forte_svechi